

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 12016077

Назва сорту: ДОКТРИН

Заявник (код): 912

Власник сорту (код): 912

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.04.2016 Патент № 160435

Дата пріоритету: 17.12.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160060

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	світлий	3
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	9,8	22,5	16,2
± до усередненої урожайності, ц/га	-4,8	2,8	-3,7
± до усередненої урожайності, %	-33	14	-19
Маса 1000 насінин, г	3,7	4,4	3,8
Висота рослин, см	84	107	111
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9	9	9
- осипання	6,6	8,1	8,8
- посухи	7,3	7	7
- пильщика ріпакового	8,9	9	9
- ріпакового квіткоїду	8,5	9	8
- бактеріозу	9	9	9
- пероноспорозу	9	9	9
Вміст, %:			
- білка	25,5	23,1	22,3
- олії	45	46,4	46,7
- глюкозинолатів	0,6	0,5	0,5
- ерукової кислоти	0,1	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.