

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка № 09052003 Назва сорту: Либідь Заявник (код): 1626 Власник сорту (код): 1626

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.10.2016 Патент № 160356

Дата пріоритету: 15.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160609

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення шкірки	фіолетове	2
2	Плоїдність	тетраплоїд	4
3	Сім'ядолі: за довжиною	ознака не визначалась	0
4	Сім'ядолі: за шириною	ознака не визначалась	0
5	Рослина: за висотою у рік сівки	низька	3
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівки	ознака не визначалась	0
7	Рослина: габітус восени у рік сівки	ознака не визначалась	0
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівки	ознака не визначалась	0
9	Рослина: за висотою навесні	ознака не визначалась	0
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	ознака не визначалась	0
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Стебло: за довжиною	ознака не визначалась	0
13	Стебло: за товщиною	товсте	7
14	Стебло: кількість міжвузлів	мала	3
15	Стебло: щільність опушення	помірна	5
16	Листок: форма центрального листочка	ознака не визначалась	0
17	Листок: центральний листочок за довжиною	середній	5
18	Листок: центральний листочок за шириною	середній	5
19	Листок: частота наявності білих міток	висока	7
20	Рослина: за природною висотою другого укосу	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га		69,6	69,5
+,- до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га		10	-9,5
+,- до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %		17	-12
Вегетаційний період, днів		65	70
Стійкість до вилягання, бал		8,3	6,8
Стійкість до посухи, бал		8,0	7,8
Стійкість до стеблової іржі, бал		8,0	7,5
Стійкість до борошнистої роси, бал		9,0	8,5
Стійкість до антракнозу, бал		8,8	7,3
Перезимувало рослин, бал		9,0	7,2
Залистяність, %		42,0	47,4
Вміст сирого протеїну, %		18,9	19,4
Напрямок використання		кормовий	кормовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.