

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 11016053

Назва сорту: Персей

Заявник (код): 1992

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету: 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

12.04.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160805

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включено)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	6,5	20,6	14,4
± до усередненої урожайності, ц/га	-8,2	1	-5,6
± до усередненої урожайності, %	-56	5	-28
Маса 1000 насінин, г	3,4	3,7	3,6
Висота рослин, см	79	106	106
Стійкість до: бал:			
- вилягання	9	9	9
- осипання	6,8	7,6	8,7
- посухи	7,4	7	7
- пильщика ріпакового	9	9	9
- ріпакового квіткоїду	7,4	9	7
- бактеріозу	9	9	9
- пероноспорозу	9	9	8,7
Вміст, %:			
- білка	26,7	24,3	23,9
- олії	43,4	45,1	45,5
- глукозинолатів	0,6	0,7	0,6
- ерукової кислоти	0,1	0	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.