

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка № 09052002

Назва сорту: Трускавчанка

Заявник (код): 370

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160746

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: забарвлення шкірки	фіолетове	2
2	Плоїдність	диплоїд	2
3	Сім'ядолі: за довжиною	ознака не визначалась	0
4	Сім'ядолі: за шириною	ознака не визначалась	0
5	Рослина: за висотою у рік сівби	середня	5
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	ознака не визначалась	0
7	Рослина: габітус восени у рік сівби	ознака не визначалась	0
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	ознака не визначалась	0
9	Рослина: за висотою навесні	ознака не визначалась	0
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	ознака не визначалась	0
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Стебло: за довжиною	ознака не визначалась	0
13	Стебло: за товщиною	товсте	7
14	Стебло: кількість міжвузлів	мало	3
15	Стебло: щільність опушення	помірне	5
16	Листок: форма центрального листочка	ознака не визначалась	0
17	Листок: довжина центрального листочка	середній	5
18	Листок: ширина центрального листочка	вузкий	3
19	Листок: частота трапляння білих міток	часто	7
20	Рослина: природна висота другого укусу	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	68,4	69,6	
+ , – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	8,9	-9,4	
+ , – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	15	-12	
Вегетаційний період, діб	65	70	
Стійкість до вилягання, бал	8,5	7,3	
Стійкість до посухи, бал	8,0	7,8	
Стійкість до стеблової іржі, бал	8,3	6,8	
Стійкість до борошнистої роси, бал	9,0	8,0	
Стійкість до антракнозу, бал	9,0	7,3	
Перезимувало рослин, бал	8,8	7,0	
Залистяність, %	45,0	47,4	
Вміст сирого протеїну, %	18,4	18,3	
Напрямок використання	корм	корм	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.