

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 14113001 Назва сорту: Бея Заявник (код): 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

31.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160759

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|------|--|------------------------|-----|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила | наявне | 9 |
| 2 | Рослина: габітус | напівпрямий | 2 |
| 3 | Рослина: довжина головного стебла | середнє | 5 |
| 4 | Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині) | відсутні | 1 |
| 5 | Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки) | ознака не визначається | 0 |
| 6 | Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку) | середні | 5 |
| 7 | Рослина: антоціанове забарвлення вузлів | наявне | 9 |
| 8 | Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів | помірне | 5 |
| 9 | Стебло: опушення вузлів | слабке | 3 |
| 10 | Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 11 | Листок: довжина пластинки | середня | 5 |
| 12 | Листок: ширина пластинки | середня | 5 |
| 13 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
| 14 | Листок: за формою | овальний | 2 |
| 15 | Листок: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 16 | Листок: пухирчастість | слабка | 3 |
| 17 | Листок: форма в поперечному перерізі | плоска | 5 |
| 18 | Листок: глясுவатість | помірна | 5 |
| 19 | Квітконіжка: положення | похиле | 2 |
| 20 | Квітка: антоціанове забарвлення пелюсток | наявне | 9 |
| 21 | Плід: забарвлення (перед досяганням) | зелене | 3 |
| 22 | Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням) | світле | 3 |
| 23 | Плід: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
| 24 | Плід: положення у просторі | поникле | 3 |
| 25 | Плід: за довжиною | середній | 5 |
| 26 | Плід: діаметр | середній | 5 |
| 27 | Плід: відношення довжина/діаметр | дуже велике | 9 |
| 28 | Плід: форма у поздовжньому розрізі | трикутна | 7 |
| 29 | Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти) | кругла | 3 |
| 30 | Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині | слабка | 3 |
| 31 | Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги) | слабка | 3 |
| 32 | Плід: структура поверхні | злегка зморшувата | 2 |
| 33 | Плід: забарвлення (за досягання) | червоне | 3 |
| 34 | Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання) | помірне | 5 |
| 35 | Плід: глясுவатість | сильна | 7 |
| 36 | Плід: порожнина у плодоніжці | відсутня | 1 |
| 37 | Плід: глибина порожнини у плодоніжці | ознака не визначається | 0 |
| 38 | Плід: форма верхівки | заокруглена | 3 |
| 39 | Плід: глибина борозенок між частками | помірні | 5 |
| 40 | Плід: кількість часток | переважно три | 3 |
| 41 | Плід: товщина м'якоті | середня | 5 |
| 42 | Плодоніжка: за довжиною | середня | 5 |
| 43 | Плодоніжка: за товщиною | середня | 5 |
| 44 | Чашечка: за характером виявлення | необгортаюча | 1 |
| 45 | Плід: капсицин у плаценті | відсутній | 1 |
| 46 | Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі) | середній | 5 |
| 47 | Час досягання | середній | 5 |
| 48,1 | Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0)) | наявна | 9 |
| 48,2 | Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2)) | наявна | 9 |
| 48,3 | Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)) | наявна | 9 |
| 49,1 | Стійкість до Potato Virus: Патотип 0 | наявна | 9 |
| 49,2 | Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 | наявна | 9 |
| 49,3 | Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2 | наявна | 9 |
| 50 | Стійкість до Phytophthora capsici | наявна | 9 |
| 51 | Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV) | наявна | 9 |
| 52 | Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) | наявна | 9 |
| 53 | Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria | наявна | 9 |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 30 т/га. Середня маса плоду – 100 г. Вміст сухої речовини – 5 %. Тривалість періоду до досягання – 125 діб. Товщина стінки плоду – 4,9 мм. Вміст загального цукру – 4 %. Вміст вітаміну С – 12 мг%. Вміст клітковини – 2,4 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.