

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 14113003 Назва сорту: Кубіста Заявник (код): 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

31.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160761

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: габітус	розлогий	3
3	Рослина: довжина головного стебла	довге	7
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	дуже довгі	9
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	слабке	3
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма в поперечному перерізі	плоска	5
18	Листок: глясுவатість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	пряме	1
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	темне	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	короткий	3
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	оранжеве	2
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірне	5
35	Плід: глясுவатість	слабка	3
36	Плід: порожнина у плодоніжці	наявна	9
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	середня	5
38	Плід: форма верхівки	дуже притиснута	5
39	Плід: глибина борозенок між частками	помірні	5
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	довга	7
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	відсутня	1
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	відсутня	1
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	відсутня	1
50	Стійкість до Phytophthora capsici	наявна	9
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 75 т/га. Середня маса плоду – 100 г. Вміст сухої речовини – 5 %. Тривалість періоду до досягання – 125 діб. Товщина стінки плоду – 4,5 мм. Вміст загального цукру – 4,2 %. Вміст вітаміну С – 13 мг%. Вміст клітковини – 2,6 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.