

**Вид:** Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

**Заявка №** 14118002 **Назва сорту:** Алабастер **Заявник (код):** 1997

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

31.03.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160776

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
3	Сім'ядол: за розміром	середні	5
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	середня	5
5	Листок: положення у просторі	напіввисхідне	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листкова пластинка: за формою	вузькооберненояцевидна	1
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	багато	7
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
17	Коренеплід: за товщиною	середній	5
18	Коренеплід: товщина головного кореня	товстий	7
19	Коренеплід: за формою	льодяна бурулька	9
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	вузькозагострена	1
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	біле	1
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	ознака не визначається	0
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: товщина кори	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час досягання	середній	5
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Середня маса плоду – 40 г. Тривалість періоду до досягання – 40 діб. Вміст сухої речовини – 7 %.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.