

**Вид:** Селера коренеплідна *Apium graveolens* L. var. *rapaceum* (Mill.) Gaud.**Заявка №** 14201001 **Назва сорту:** Астерікс **Заявник (код):** 1997**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

31.03.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160778**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

<b>№</b>	<b>Ознака</b>	<b>Проявлення</b>	<b>Код</b>
1	Рослина: за висотою	середня	5
2	Листок: положення у просторі	напівпрямe	3
3	Листя: кількість	багатo	7
4	Листя: діаметр місця прикріплення черешків на коренеплоді	середній	5
5	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішніх листків	помірне	5
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення сформованих листків	помірне	5
7	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
9	Листкова пластинка: відстань між 1-ю та 2-ю парами листочків	довга	7
10	Черешок: за довжиною	середній	5
11	Черешок: за шириною	середній	5
12	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
13	Листкова пластинка: розмір верхівкового листочка	середній	5
14	Листочек: форма краю верхівки	промежна	2
15	Листочек: щільність надрізів краю	не щільна	3
17	Коренеплід: за розміром	великий	7
18	Коренеплід: виступи на поверхні	незначні	3
19	Коренеплід: основний колір шкірки	блідуватий	1
20	Лише для сортів, коренеплоди яких коричневого забарвлення. Коренеплід: інтенсивність основного кольору шкірки	ознака не визначалась	0
21	Коренеплід: місце розташування коренів	низьке	3
22	Коренеплід: кількість коренів	середня кількість	5
23	Коренеплід: корені за товщиною	тонкі	3
24	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	округла	2
25	Коренеплід: забарвлення мякоті	бліле	1
26	Коренеплід: внутрішнє заглиблення	маle	3
27	Коренеплід: губчастість мякоті	слабка	3
28	Коренеплід: внутрішня іржаста плямистість мякоті	слабка	3

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Тривалість періоду від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стигlosti – 130 діб. Середня маса коренеплоду – 400 г. Вміст клітковини – 45 %.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.