

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 13106019 **Назва сорту:** Каліпсо **Заявник (код):** 1928

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

22.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160793

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|------|--|----------------------------|-----|
| 1 | Рослина: кількість листків на псевдостеблі | багато | 7 |
| 2 | Листя: положення | напівпряме | 3 |
| 3 | Листя: восковий наліт | відсутній або дуже слабкий | 1 |
| 4 | Листя: інтенсивність зеленого забарвлення | світле | 3 |
| 5 | Листя: зігнутість | сильна | 3 |
| 6,1 | Тільки цибулевi сорти. Листок: за довжиною | довгий | 7 |
| 6,2 | Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною | ознака не визначається | 0 |
| 7,1 | Тільки цибулевi сорти. Листок: діаметр | середній | 5 |
| 7,2 | Тільки сорти шалот. Листок: діаметр | ознака не визначається | 0 |
| 8 | Тільки цибулевi сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка) | середнє | 5 |
| 9 | Тільки цибулевi сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини) | середній | 5 |
| 10 | Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини) | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 11 | Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 12,1 | Тільки цибулевi сорти. Цибулина: за розміром | велика | 7 |
| 12,2 | Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром | ознака не визначається | 0 |
| 13,1 | Тільки цибулевi сорти. Цибулина: за висотою | середня | 5 |
| 13,2 | Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою | ознака не визначається | 0 |
| 14,1 | Тільки цибулевi сорти. Цибулина: діаметр | великий | 7 |
| 14,2 | Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр | ознака не визначається | 0 |
| 15,1 | Тільки цибулевi сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра | середнє | 5 |
| 15,2 | Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота / діаметр | ознака не визначається | 0 |
| 16 | Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра | посередині | 2 |
| 17 | Цибулина/цибулінка: ширина шийки | середня | 5 |
| 18 | Цибулина/цибулінка: форма (у поздовжньому розрізі) | округла | 4 |
| 19 | Тільки цибулевi сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18) | злегка опукла | 3 |
| 20 | Цибулина/цибулінка: форма основи (як для 18) | округла | 3 |
| 21 | Цибулина/цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання | помірна | 5 |
| 22 | Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки | середня | 5 |
| 23 | Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки | коричневий | 5 |
| 24 | За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки | помірне | 5 |
| 25 | Цибулина/цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки | коричнюватий | 5 |
| 26 | Цибулина/цибулінка: забарвлення соковитих лусок | зеленувате | 2 |
| 27 | Цибулина/цибулінка: кількість точок зростання на кг | мало | 3 |
| 28 | Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини | низький | 3 |
| 29 | Тільки цибулевi сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 30 | Тільки цибулевi сорти. Час стрілкування за весняної сівби | ознака не визначається | 0 |
| 31 | Тільки цибулевi сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени | ознака не визначалася | 0 |
| 32 | Тільки цибулевi сорти. Час стрілкування за сівби восени | ознака не визначається | 0 |
| 33 | Тільки цибулевi сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин) | ознака не визначається | 0 |
| 34,1 | Тільки цибулевi сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33) | середній | 5 |
| 34,2 | Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33) | ознака не визначається | 0 |
| 35 | Час проростання за зберігання цибулин | ознака не визначалась | 0 |
| 36 | Чоловіча стерильність | ознака не визначалась | 0 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 94 т/га. Товарна урожайність – 89 т/га. Тривалість періоду вегетації рослин – 120 дiб. Лежкість – 150 дiб. Вміст сухої речовини – 11,6 %. Вміст загального цукру – 8,4 %. Вміст вітаміну С – 8,7 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.