

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 13909162 Назва сорту: B49583

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160397

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №    | Ознака   | Проявлення                    | Код |
|------|--|-------------------------------|-----|
| 1    | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви   | помірне                       | 5   |
| 2    | Перший листок: форма верхівки  | округла                       | 3   |
| 3    | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | помірне                       | 2   |
| 4    | Листок: хвилястість краю пластинки   | відсутня або дуже слабка      | 1   |
| 5    | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом  | великий                       | 7   |
| 6    | Листок: положення пластинки у просторі   | ледь похиле                   | 3   |
| 7    | Стебло: зигзагоподібність  | слабка                        | 2   |
| 8    | Волоть: час цвітіння   | від дуже раннього до раннього | 2   |
| 9    | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски  | відсутнє або дуже слабе       | 1   |
| 10   | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи  | помірне                       | 5   |
| 11   | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків  | слабе                         | 3   |
| 12   | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками  | великий                       | 7   |
| 13   | Волоть: положення бічних гілочок у просторі  | ледь похиле                   | 3   |
| 14   | Волоть: кількість первинних бічних гілочок   | відсутні або дуже мало        | 1   |
| 15   | Качан: час появи шовку   | від дуже раннього до раннього | 2   |
| 16   | Качан: антоціанове забарвлення шовку   | помірне                       | 5   |
| 17   | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів   | слабе                         | 3   |
| 18   | Волоть: щільність розташування колосків  | нешільне                      | 3   |
| 19   | Листок: антоціанове забарвлення піхви  | відсутнє або дуже слабе       | 1   |
| 20   | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів  | відсутнє або дуже слабе       | 1   |
| 21   | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)  | середня                       | 5   |
| 22   | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)   | коротка                       | 3   |
| 23   | Волоть: бічна гілочка за довжиною  | коротка                       | 3   |
| 24,1 | Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною                                     | дуже довга                    | 9   |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною | ознака не визначається        | 0   |
| 25   | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини   | дуже мале                     | 1   |
| 26   | Листок: ширина пластинки   | вузька                        | 3   |
| 27   | Качан: ніжка за довжиною   | коротка                       | 3   |
| 28   | Качан: за довжиною   | довгий                        | 7   |
| 29   | Качан: діаметр (посередині)  | середній                      | 5   |
| 30   | Качан: форма   | конусно-циліндрична           | 2   |
| 31   | Качан: кількість зернових рядів  | мала                          | 3   |
| 32   | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин   | ознака не визначається        | 0   |
| 33   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору   | ознака не визначається        | 0   |
| 34   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною   | ознака не визначається        | 0   |
| 35   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною  | ознака не визначається        | 0   |
| 36   | Качан: тип зернівки  | проміжний                     | 3   |
| 37   | Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок  | ознака не визначається        | 0   |
| 38   | Качан: колір верхівок зернівок   | жовто-оранжевий               | 4   |
| 39   | За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок  | жовто-оранжевий               | 4   |
| 40   | Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення  | ознака не визначається        | 0   |
| 41   | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня   | дуже сильне                   | 9   |