

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 13909277 Назва сорту: ІІ8

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.03.2016 Патент № 160113

Дата пріоритету: 23.12.2013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160202

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №    | Ознака   | Проявлення                 | Код |
|------|--|----------------------------|-----|
| 1    | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви   | дуже сильне                | 9   |
| 2    | Перший листок: форма верхівки  | округла                    | 3   |
| 3    | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | помірне                    | 2   |
| 4    | Листок: хвилястість краю пластинки   | помірна                    | 2   |
| 5    | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом  | середній                   | 5   |
| 6    | Листок: положення пластинки у просторі   | пряме                      | 1   |
| 7    | Стебло: зигзагоподібність  | відсутня або дуже слабка   | 1   |
| 8    | Волоть: час цвітіння   | від середнього до пізнього | 6   |
| 9    | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски  | відсутнє або дуже слабе    | 1   |
| 10   | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи  | слабе                      | 3   |
| 11   | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків  | відсутнє або дуже слабе    | 1   |
| 12   | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками  | середній                   | 5   |
| 13   | Волоть: положення бічних гілочок у просторі  | ледь похиле                | 3   |
| 14   | Волоть: кількість первинних бічних гілочок   | мало                       | 3   |
| 15   | Качан: час появи шовку   | від середнього до пізнього | 6   |
| 16   | Качан: антоціанове забарвлення шовку   | слабе                      | 3   |
| 17   | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів   | помірне                    | 5   |
| 18   | Волоть: щільність розташування колосків  | середньої щільності        | 5   |
| 19   | Листок: антоціанове забарвлення піхви  | відсутнє або дуже слабе    | 1   |
| 20   | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів  | відсутнє або дуже слабе    | 1   |
| 21   | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)  | середня                    | 5   |
| 22   | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)   | коротка                    | 3   |
| 23   | Волоть: бічна гілочка за довжиною  | коротка                    | 3   |
| 24,1 | Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною                                     | середня                    | 5   |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною | ознака не визначається     | 0   |
| 25   | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини   | дуже мале                  | 1   |
| 26   | Листок: ширина пластинки   | вузька                     | 3   |
| 27   | Качан: ніжка за довжиною   | коротка                    | 3   |
| 28   | Качан: за довжиною   | короткий                   | 3   |
| 29   | Качан: діаметр (посередині)  | малий                      | 3   |
| 30   | Качан: форма   | циліндрична                | 3   |
| 31   | Качан: кількість зернових рядів  | мала                       | 3   |
| 32   | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин   | ознака не визначається     | 0   |
| 33   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору   | ознака не визначається     | 0   |
| 34   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною   | ознака не визначається     | 0   |
| 35   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною  | ознака не визначається     | 0   |
| 36   | Качан: тип зернівки  | кременистоподібний         | 2   |
| 37   | Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкватість верхівок зернівок   | ознака не визначається     | 0   |
| 38   | Качан: колір верхівок зернівок   | жовто-оранжевий            | 4   |
| 39   | За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок  | жовто-оранжевий            | 4   |
| 40   | Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення  | ознака не визначається     | 0   |
| 41   | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня   | помірне                    | 5   |