

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка №** 14909241 **Назва сорту:** P10063

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 23.02.2016 **Патент №** 160034

**Дата пріоритету:** 09.12.2014

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 05.02.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160049

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака   | Проявлення                  | Код |
|------|--|-----------------------------|-----|
| 1    | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви   | слабке                      | 3   |
| 2    | Перший листок: форма верхівки  | від загостреної до округлої | 2   |
| 3    | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | помірне                     | 2   |
| 4    | Листок: хвилястість краю пластинки   | помірна                     | 2   |
| 5    | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом  | малий                       | 3   |
| 6    | Листок: положення пластинки у просторі   | помірно похиле              | 5   |
| 7    | Стебло: зигзагоподібність  | відсутня або дуже слабка    | 1   |
| 8    | Волость: час цвітіння  | пізній                      | 7   |
| 9    | Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски   | відсутнє або дуже слабке    | 1   |
| 10   | Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи   | помірне                     | 5   |
| 11   | Волость: антоціанове забарвлення пиляків   | слабке                      | 3   |
| 12   | Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками   | середній                    | 5   |
| 13   | Волость: положення бічних гілочок у просторі   | ледь похиле                 | 3   |
| 14   | Волость: кількість первинних бічних гілочок  | середня кількість           | 5   |
| 15   | Качан: час появи шовку   | пізній                      | 7   |
| 16   | Качан: антоціанове забарвлення шовку   | помірне                     | 5   |
| 17   | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів   | помірне                     | 5   |
| 18   | Волость: щільність розташування колосків   | середньої щільності         | 5   |
| 19   | Листок: антоціанове забарвлення піхви  | відсутнє або дуже слабке    | 1   |
| 20   | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів  | відсутнє або дуже слабке    | 1   |
| 21   | Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)   | середня                     | 5   |
| 22   | Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)  | середня                     | 5   |
| 23   | Волость: бічна гілочка за довжиною   | середня                     | 5   |
| 24,1 | Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною                                     | середня                     | 5   |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною | ознака не визначається      | 0   |
| 25   | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини   | дуже мале                   | 1   |
| 26   | Листок: ширина пластинки   | середня                     | 5   |
| 27   | Качан: ніжка за довжиною   | коротка                     | 3   |
| 28   | Качан: за довжиною   | дуже довгий                 | 9   |
| 29   | Качан: діаметр (посередині)  | малий                       | 3   |
| 30   | Качан: форма   | конусно-циліндрична         | 2   |
| 31   | Качан: кількість зернових рядів  | мала                        | 3   |
| 32   | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин   | ознака не визначається      | 0   |
| 33   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору   | ознака не визначається      | 0   |
| 34   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною   | ознака не визначається      | 0   |
| 35   | Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною  | ознака не визначається      | 0   |
| 36   | Качан: тип зернівки  | проміжний                   | 3   |
| 37   | Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкватість верхівок зернівок   | ознака не визначається      | 0   |
| 38   | Качан: колір верхівок зернівок   | жовто-оранжевий             | 4   |
| 39   | За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок  | жовто-оранжевий             | 4   |
| 40   | Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення  | ознака не визначається      | 0   |
| 41   | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня   | відсутнє або дуже слабке    | 1   |