

Вид: Овес голозерний *Avena nuda* L.

Заявка № 13520002 **Назва сорту:** Тембр

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160621

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: рабітус	напівпрямий	3
2	Найнижчі листки: опушеність пластинки	слабка	3
3	Листкова пластинка: опушеність країв листка	слабка	3
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	помірно	5
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	ранній	3
6	Стебло: опушеність найвищого вузла	відсутня	1
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	ознака не визначалась	0
8	Волоть: орієнтація гілочок	розкидиста	3
9	Волоть: положення гілочок	напівпряме	3
10	Волоть: положення вторинних колосків	пряме	1
11	Колоскові луски: сіруватість	слабка	3
12	Колоскові луски: за довжиною	довгі	7
13	Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски	відсутня	1
14	Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	ознака не визначалась	0
15	Рослина: за висотою	середня	5
16	Волоть: за довжиною	середня	5
17	Зернівка: плівка	відсутня	1
18	Первинна зернівка: тенденція до остистості	слабка	3
19	Первинна зернівка: довжина нижньої квіткової луски	коротка	3
20	Зернівка: колір нижньої квіткової луски	жовтий	2
21	Первинне зерно: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1
22	Первинна зернівка: опушення основи	слабке	3
23	Первинна зернівка: довжина базальних волосків	короткі	3
24	Первинна зернівка: довжина стрижня другої зернівки	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність за стандартної вологості – 4,22 т/га, вміст білка 15,5%, група стиглості – середня. Стійкість до обсіпання – 9 балів, посухостійкість – 5 балів. Стійкість проти ураження гелмінтоспориозом, твердою та летючою сажкою, бурю бактеріальною плямистістю – 7 балів, стійкість проти ураження борошнистою росю, стебловою іржею, аскохітозом – 9 балів. Стійкість до заселення шкідниками – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.