

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 12007001 Назва сорту: Анатолія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету: 30.01.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151142

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака                                                                | Проявлення                 | Код |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1  | Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення                         | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 2  | Рослина: форма куща (габітус)                                         | пряmostоячий               | 1   |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                     | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 4  | Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка                      | рідко                      | 3   |
| 5  | Початок колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів)              | раннє                      | 3   |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві                           | сильний                    | 7   |
| 7  | Колос: восковий наліт                                                 | сильний                    | 7   |
| 8  | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі                        | сильний                    | 7   |
| 9  | Рослина: за висотою (стебло і колос)                                  | середня                    | 5   |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) | слабко виповнена           | 3   |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку)                                           | циліндрична                | 2   |
| 12 | Колос: за щільністю                                                   | середній                   | 5   |
| 13 | Колос: за довжиною                                                    | короткий                   | 3   |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок                        | наявні остюки              | 3   |
| 15 | Колос: довжина зубців / остюків на верхівці                           | дуже довгі                 | 9   |
| 16 | Колос: колір                                                          | білий або солом'яно-жовтий | 1   |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла                   | помірне                    | 5   |
| 18 | Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)       | відсутнє або дуже вузьке   | 1   |
| 19 | Нижня колоскова луска: форма плеча                                    | скошене                    | 1   |
| 20 | Нижня колоскова луска: довжина зубця                                  | середній                   | 5   |
| 21 | Нижня колоскова луска: форма зубця                                    | дуже зігнутий              | 7   |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні                  | слабке                     | 3   |
| 23 | Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця                        | ознака не визначалась      | 0   |
| 24 | Зернівка: колір                                                       | червоний                   | 2   |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі                                        | світле                     | 3   |
| 26 | Тип розвитку                                                          | озимий                     | 1   |
| 27 | Зернівка: за довжиною                                                 | середня                    | 5   |
| 28 | Зернівка: за шириною                                                  | середня                    | 5   |
| 29 | Зернівка: відношення довжина / ширина                                 | велике                     | 7   |
| 30 | Зернівка: за крупністю                                                | середня                    | 5   |
| 31 | Язичок: виявлення                                                     | короткий                   | 3   |
| 32 | Нижня квітова луска: кіль                                             | відсутній                  | 1   |
| 33 | Вушка: за формою                                                      | гострі                     | 2   |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні                         | слабке                     | 3   |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)    | овально-ланцетна           | 3   |

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник                                                            | Значення |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
|                                                                     | С        | Л    | П    |
| Урожайність, ц/га                                                   | 52,9     | 59,8 | 51,3 |
| + , - до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га | 5,5      | -2,8 | -4,2 |
| %                                                                   | 12       | -4   | -8   |
| Вегетаційний період, днів                                           | 264      | 272  | 279  |
| Висота рослин, см                                                   | 83       | 82   | 81   |
| Маса 1000 зерен, г                                                  | 38,3     | 41,5 | 42,4 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал                                  | 8,2      | 8,5  | 8,8  |
| Стійкість до, бал: полягання                                        | 8,4      | 8,3  | 8,7  |
| осипання                                                            | 8,9      | 8,5  | 8,6  |
| посухи                                                              | 8,3      | 8,6  | 8,5  |
| борошнистої роси                                                    | 8,6      | 8,1  | 7,7  |
| бурої іржі                                                          | 8,5      | 8,5  | 8,4  |
| фузаріозу                                                           | 9,0      | 8,8  | 8,6  |
| Вміст білка, %                                                      | 13,7     | 13,6 | 13,2 |
| Вміст клейковини, %                                                 | 28,2     | 27,6 | 27,0 |
| W, о. а.                                                            | 260      | 260  | 260  |
| Об'єм хліба, мл                                                     | 1030     | 1020 | 1100 |
| Напрямок використання                                               | ц        | ц    | ц    |
| Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):                              |          |      |      |
| загальна оцінка, бал                                                | 5,5      |      |      |
| група зимостійкості                                                 | середня  |      |      |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.