

Вид: Горох польовий (пелюшка) *Pisum arvense L.***Заявка № 16242001 Назва сорту:** Гранд **Заявник (код):** 1936 **Власник сорту (код):** 1936**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 13.09.2018**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180889****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|----------------------------|-----|----------|
| 1 | Насініна: форма | куляста | 1 | |
| 2 | Насініна: забарвлення сім'ядолей | жовте | 2 | |
| 3 | Тільки сорти з антоціановим забарвленням. Насініна: мармуровість насінневої шкірки | відсутня | 1 | |
| 4 | Тільки сорти з антоціановим забарвленням. Насініна: фіолетові або рожеві плями на насінній шкірці | відсутні | 1 | |
| 5 | Насініна: чорне забарвлення рубчика (шва) | відсутнє | 1 | |
| 6 | Тільки сорти з антоціановим забарвленням. Насініна: забарвлення шкірки | коричнево-зелене | 3 | |
| 7 | Насініна: ямкуватість сім'ядолей | наявна | 9 | |
| 8 | Рослина: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 9 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 10 | Стебло: фасціація | відсутня | 1 | |
| 11 | Стебло: за довжиною | середнє | 5 | |
| 12 | Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно) | середня | 5 | |
| 13 | Тільки сорти з антоціановим забарвленням. Стебло: антоціанове забарвлення пазухи листка | наявне | 9 | |
| 14 | Тільки сорти з антоціановим забарвленням. Стебло: тип антоціанового забарвлення пазухи листка | просте кільце | 1 | |
| 15 | Листок: забарвлення | зелене | 2 | |
| 16 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком жовто-зелених та блакитно-зелених сортів) | помірна | 5 | |
| 17 | Листок: сіруватий відтінок | наявний | 9 | |
| 18 | Листок: вторинні листочки | наявні | 9 | |
| 19 | Листок: восковий наліт на верхніх вторинних листочках | відсутній | 1 | |
| 20 | Вторинний листочек: за розміром | середній | 5 | |
| 21 | Вторинний листочек: за довжиною | середній | 5 | |
| 22 | Вторинний листочек: за ширину | середній | 5 | |
| 23 | Вторинний листочек: відстань від найширишої частини до основи | середня | 5 | |
| 24 | Вторинний листочек: зубчастість | наявна | 9 | |
| 25 | Вторинний листочек: ступінь зубчастості | слабкий | 3 | |
| 26 | Прилисток: тип розвитку | добре розвинutий | 2 | |
| 27 | Прилисток: форма «кролячі вуха» | відсутні | 1 | |
| 28 | Прилисток: восковий наліт на поверхні | відсутній | 1 | |
| 29 | Прилисток: за довжиною | середній | 5 | |
| 30 | Прилисток: за шириною | широкий | 7 | |
| 31 | Прилисток: плямистість | наявна | 9 | |
| 32 | Прилисток: щільність плямистості | ознака не визначалась | 0 | |
| 33 | Черешок: за довжиною (від пазухи до першого вусика) | середній | 5 | |
| 34 | Рослина: час цвітіння | середній | 5 | |
| 35 | Тільки нефасційовані сорти (немутовчасті). Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі | дві | 2 | |
| 36 | Тільки сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел) | рожеве | 2 | |
| 37 | Тільки сорти з червонувато-пурпуровими квітками. Квітка: інтенсивність забарвлення крил (весел) | помірна | 5 | |
| 38 | Тільки сорти з червонувато-пурпуровими квітками. Квітка: інтенсивність забарвлення паруса | сильна | 7 | |
| 39 | Тільки сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса | ознака не визначається | 0 | |
| 40 | Квітка: максимальна ширина паруса | велика | 7 | |
| 41 | Квітка: форма основи паруса | рівна | 3 | |
| 42 | Квітка: інтенсивність хвилястості паруса | сильна | 7 | |
| 43 | Квітка: чашолисток за ширину | середній | 5 | |
| 44 | Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка (на другому квітучому вузлі) | з довгим вістрям | 1 | |
| 45 | Квітконос: відстань від стебла до першої квітки | велика | 7 | |
| 46 | Біб: за довжиною | середній | 5 | |
| 47 | Біб: за шириною | середній | 5 | |
| 48 | Біб: пергаментний шар | частково наявний | 2 | |
| 49 | Біб: ступінь вигину | відсутній або дуже слабкий | 1 | |
| 50 | Біб: тип вигину | увігнутий | 1 | |
| 51 | Біб: форма верхівки | тула | 2 | |
| 52 | Біб: забарвлення | жовте | 1 | |
| 53 | Рослина: час достигання | середній | 5 | |
| 54 | Насіння: маса | велика | 7 | |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 4,3. Урожайність зеленої маси, т/га – 34,4. Вміст сухої речовини, % – 22,1. Вміст білка, % – 27,9. Вегетаційний період, діб – 82. Залишаність, % – 42,7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса, кореневі гнилі, іржа, септоріоз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.