

**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

**Заявка №** 12007050 **Назва сорту:** Олівін

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

30.12.2015

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 151144

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення                 | Код |
|----|---|----------------------------|-----|
| 1  | Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення                         | відсутнє або дуже слабе    | 1   |
| 2  | Рослина: форма куща (габітус)   | напіврозлогий              | 5   |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                     | відсутнє або дуже слабе    | 1   |
| 4  | Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка                      | рідко                      | 3   |
| 5  | Початок колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів)              | пізнє                      | 7   |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві                           | сильний                    | 7   |
| 7  | Колос: восковий наліт   | сильний                    | 7   |
| 8  | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі                        | сильний                    | 7   |
| 9  | Рослина: за висотою (стебло і колос)                                  | середня                    | 5   |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) | слабко виповнена           | 3   |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку)   | циліндрична                | 2   |
| 12 | Колос: за щільністю   | середній                   | 5   |
| 13 | Колос: за довжиною  | довгий                     | 7   |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок                        | обое відсутні              | 1   |
| 15 | Колос: довжина зубців / остюків на верхівці                           | ознака не визначалась      | 0   |
| 16 | Колос: колір  | білий або солом'яно-жовтий | 1   |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла                   | слабке                     | 3   |
| 18 | Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)       | відсутнє або дуже вузьке   | 1   |
| 19 | Нижня колоскова луска: форма плеча                                    | скошене                    | 1   |
| 20 | Нижня колоскова луска: довжина зубця                                  | короткий                   | 3   |
| 21 | Нижня колоскова луска: форма зубця                                    | дуже зігнутий              | 7   |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні                  | слабке                     | 3   |
| 23 | Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця                       | дуже зігнутий              | 4   |
| 24 | Зернівка: колір   | червоний                   | 2   |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі  | світле                     | 3   |
| 26 | Тип розвитку  | озимий                     | 1   |
| 27 | Зернівка: за довжиною   | коротка                    | 3   |
| 28 | Зернівка: за шириною  | середня                    | 5   |
| 29 | Зернівка: відношення довжина / ширина                                 | середнє                    | 5   |
| 30 | Зернівка: за крупністю  | дрібна                     | 3   |
| 31 | Язичок: виявлення   | середній                   | 5   |
| 32 | Нижня квіткова луска: кіль  | відсутній                  | 1   |
| 33 | Вушка: за формою  | гострі                     | 2   |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні                         | слабке                     | 3   |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)    | овальна                    | 2   |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник  | Значення |      |      |
|---|----------|------|------|
|   | С        | Л    | П    |
| Урожайність, ц/га   | 48,3     | 65,3 | 64,9 |
| + , - до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га | 0,9      | 2,7  | 9,4  |
| %   | 2        | 4    | 17   |
| Вегетаційний період, днів   | 273      | 275  | 282  |
| Висота рослин, см   | 84       | 84   | 92   |
| Маса 1000 зерен, г  | 38,5     | 40,1 | 43,4 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал                                  | 8,3      | 8,7  | 8,8  |
| Стійкість до, бал: полягання  | 8,8      | 8,6  | 8,8  |
| осипання  | 8,4      | 8,9  | 9,0  |
| посухи  | 8,3      | 8,8  | 8,7  |
| борошністої роси  | 8,4      | 8,9  | 9,0  |
| бурої іржі  | 8,1      | 8,6  | 8,3  |
| фузаріозу   | 9,0      | 8,8  | 8,6  |
| Вміст білка, %  | 14,0     | 13,0 | 13,3 |
| Вміст клейковини, %   | 28,4     | 26,6 | 26,8 |
| W, о. а.  | 260      | 264  | 229  |
| Об'єм хліба, мл   | 970      | 970  | 640  |
| Напрямок використання   | ц        | ц    | ф    |
| Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):                              |          |      |      |
| загальна оцінка, бал  | 5,5      |      |      |
| група зимостійкості   | середня  |      |      |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.