

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 13012020 **Назва сорту:** Трудівниця

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160713

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|----------------------------|-----|
| 1 | Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 2 | Рослина: форма куща (габітус) | напівпрямостоячий | 3 |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 4 | Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка | рідко | 3 |
| 5 | Початок колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів) | раннє | 3 |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | слабкий | 3 |
| 7 | Колос: восковий наліт | помірний | 5 |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | слабкий | 3 |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | низька | 3 |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) | слабко виповнена | 3 |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | пірамідальна | 1 |
| 12 | Колос: за щільністю | середній | 5 |
| 13 | Колос: за довжиною | довгий | 7 |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні остюки | 3 |
| 15 | Колос: довжина зубців / остюків на верхівці | дуже довгі | 9 |
| 16 | Колос: колір | білий або солом'яно-жовтий | 1 |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 18 | Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса) | вузьке | 3 |
| 19 | Нижня колоскова луска: форма плеча | скошене | 1 |
| 20 | Нижня колоскова луска: довжина зубця | дуже короткий | 1 |
| 21 | Нижня колоскова луска: форма зубця | середньо зігнутий | 5 |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | слабке | 3 |
| 23 | Нижня квітова луска першої квіттки: форма зубця | ознака не визначалась | 0 |
| 24 | Зернівка: колір | червоний | 2 |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | помірне | 5 |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 |
| 27 | Зернівка: за довжиною | середня | 5 |
| 28 | Зернівка: за шириною | середня | 5 |
| 29 | Зернівка: відношення довжина / ширина | велике | 7 |
| 30 | Зернівка: за крупністю | середня | 5 |
| 31 | Язичок: виявлення | короткий | 3 |
| 32 | Нижня квітова луска: кіль | відсутній | 1 |
| 33 | Вушка: за формою | гострі | 2 |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | слабке | 3 |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) | ланцетна | 4 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|--|----------|------|------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 56,4 | 67,4 | 62,7 |
| +, - до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га | 9,0 | 4,9 | 7,2 |
| % | 19 | 8 | 13 |
| Вегетаційний період, днів | 268 | 272 | 277 |
| Висота рослин, см | 86 | 90 | 93 |
| Маса 1000 зерен, г | 41,1 | 45,4 | 49,1 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 8,5 | 8,9 | 9,0 |
| Стійкість до, бал: полягання | 8,5 | 8,3 | 8,7 |
| осипання | 9,0 | 8,6 | 8,6 |
| посухи | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| борошнистої роси | 8,3 | 8,4 | 8,1 |
| бурої іржі | 8,6 | 8,4 | 8,7 |
| фузаріозу | 9,0 | 8,6 | 8,8 |
| Вміст білка, % | 13,0 | 14,0 | 13,4 |
| Вміст клейковини, % | 26,3 | 29,8 | 27,2 |
| W, о. а. | 260 | 280 | 269 |
| Об'єм хліба, мл | 970 | 980 | 970 |
| Напрямок використання | ц | с | ц |
| Морозо-, зимостійкість (за даними ІР): | | | |
| загальна оцінка, бал | 7,0 | | |
| група зимостійкості | висока | | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.