

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 14006001 Назва сорту: Дуромакс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.03.2016 Патент № 160137

Дата пріоритету: 14.01.2014

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160571

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака  | Проявлення                 | Код |
|----|---|----------------------------|-----|
| 1  | Колеоптиль: антоціанове забарвлення   | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 2  | Перший листок: антоціанове забарвлення                                      | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 3  | Рослина: габітус  | прямостоячий               | 1   |
| 4  | Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка                            | відсутній або дуже рідко   | 1   |
| 5  | Початок колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів)                    | раннє                      | 3   |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві                                 | дуже сильний               | 9   |
| 7  | Прапорцевий листок: восковий наліт на листковій пластинці (з нижнього боку) | сильний                    | 7   |
| 8  | Остюки: антоціанове забарвлення   | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 9  | Соломина: опушення верхнього вузла  | відсутнє або дуже слабке   | 1   |
| 10 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі                              | дуже сильний               | 9   |
| 11 | Колос: восковий наліт   | дуже сильний               | 9   |
| 12 | Рослина: за висотою (стебло і колос)  | низька                     | 3   |
| 13 | Колос: наявність і розміщення остюків                                       | по всій довжині колоса     | 4   |
| 14 | Остюки на верхівці колоса: довжина відносно колоса                          | довші                      | 3   |
| 15 | Нижня колоскова луска: за формою  | видовжена                  | 5   |
| 16 | Нижня колоскова луска: форма плеча  | піднесене                  | 4   |
| 17 | Нижня колоскова луска: ширина плеча   | вузьке                     | 3   |
| 18 | Нижня колоскова луска: довжина зубця  | середній                   | 5   |
| 19 | Нижня колоскова луска: форма зубця  | ледь зігнутий              | 2   |
| 20 | Нижня колоскова луска: опушення зовні                                       | відсутнє                   | 1   |
| 21 | Соломина: виповнення (між основою колоса і верхнім вузлом)                  | помірне                    | 5   |
| 22 | Остюки: колір   | чорні                      | 4   |
| 23 | Колос: за довжиною (без остюків)  | дуже короткий              | 1   |
| 24 | Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня                          | слабке                     | 3   |
| 25 | Колос: інтенсивність забарвлення за досягання                               | білий                      | 1   |
| 26 | Колос: форма  | циліндрична                | 2   |
| 27 | Колос: за щільністю   | середній                   | 5   |
| 28 | Зернівка: форма   | видовжена                  | 7   |
| 29 | Зернівка: довжина чубка (вид зі спинки)                                     | короткий                   | 3   |
| 30 | Зернівка: забарвлення у фенолі  | відсутнє або дуже світле   | 1   |
| 31 | Тип розвитку  | ярий                       | 3   |
| 32 | Колос: колір  | білий або солом'яно-жовтий | 1   |
| 33 | Язичок: за формою   | округлий                   | 1   |
| 34 | Язичок: ступінь виявлення   | короткий                   | 3   |
| 35 | Вушка: охоплення соломини   | неповне                    | 1   |

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник  | Значення |      |   |
|---|----------|------|---|
|   | С        | Л    | П |
| Урожайність, ц/га                                 | 21,6     | 36,4 | - |
| +, - до урожайності сортів за 5 попередніх років: |          |      |   |
| ц/га  | 1,3      | 5    | - |
| %   | 6        | 16   | - |
| Вегетаційний період, діб                          | 88       | 85   | - |
| Висота рослин, см                                 | 49       | 69   | - |
| Маса 1000 зерен, г                                | 41,4     | 42,7 | - |
| Стійкість до, бал:                                |          |      |   |
| вильгання   | 9,0      | 9,0  | - |
| осипання  | 9,0      | 9,0  | - |
| посухи  | 7,4      | 8,3  | - |
| борошністої роси                                  | 8,6      | 9,0  | - |
| бурої іржі  | 8,4      | 9,0  | - |
| фузаріозу   | 8,8      | 9,0  | - |
| Якість:   |          |      |   |
| вміст білка, %                                    | 15,0     | 14,7 | - |
| вміст клейковини, %                               | -        | -    | - |
| W, о. а.  | -        | -    | - |
| об'єм хліба зі 100 г борошна, г                   | -        | -    | - |
| Напрямок використання                             | х        | х    | - |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.