

Вид: Тритикале (яре) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 13288001 **Назва сорту:** Гусар харківський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160672

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1 | Рослина: за плоідністю | гексаплоїд | 6 |
| 2 | Колеоптиль: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 3 | Рослина: форма куща | прямий | 1 |
| 4 | Рослина: частота рослин з похилими прапорцевими листками | мало | 3 |
| 5 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | слабке | 3 |
| 6 | Початок колосіння (перший колосок помітний у 50 % рослин) | середнє | 5 |
| 7 | Прапорцевий листок: сизий наліт на піхві | помірний | 5 |
| 8 | Остюки: антоціанове забарвлення | слабке | 3 |
| 9 | Пиляки: антоціанове забарвлення | слабке | 3 |
| 10 | Прапорцевий листок: довжина листової пластинки | середня | 5 |
| 11 | Прапорцевий листок: ширина листової пластинки | вузька | 3 |
| 12 | Колос: сизий наліт | помірний | 5 |
| 13 | Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля | сильне | 7 |
| 14 | Рослина: висота (разом зі стеблом, колосом та остюками) | висока | 7 |
| 15 | Колос: розміщення остюків | за всією довжиною | 3 |
| 16 | Остюки: довжина відносно колосу | середній | 5 |
| 17 | Нижня колоскова луска: довжина кільового зубця (колосок із середньої третини колоса) | середній | 5 |
| 18 | Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17) | середній | 5 |
| 19 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17) | наявне | 9 |
| 20 | Соломина: виповнення у поперечному розрізі (між основою колосу і верхнім вузлом) | середньо-виповнена | 5 |
| 21 | Колос: за кольором | сіро-димчастий | 2 |
| 22 | Колос: за щільністю | щільний | 7 |
| 23 | Колос: за довжиною (без остюків) | середній | 5 |
| 24 | Колос: за шириною (вигляд збоку) | середній | 5 |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | відсутнє або дуже світле | 1 |
| 26 | Тип розвитку | ярий | 3 |
| 27 | Колос: за формою | циліндричний | 2 |
| 28 | Колос: наявність остюків | наявні | 9 |
| 29 | Вісь колосу: за міцністю | гнучка | 9 |
| 30 | Колосок: кількість квіток | середня кількість | 5 |
| 31 | Колосок: плідність квіток | плідні | 1 |
| 32 | Зернівка: за формою | яйцеподібна | 3 |
| 33 | Зернівка: за кольором | світло-коричнева | 3 |
| 34 | Зернівка: характер поверхні | гладенька | 9 |
| 35 | Зернівка: за крупністю | крупна | 7 |
| 36 | Колос: положення в просторі | прямий | 1 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|--|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 27,5 | 24,6 | 37,5 |
| Гарантована прибавка до усеред. урож.: | | | |
| ц/га | 5,4 | - 6,2 | 4,6 |
| % | 24 | - 20 | 14 |
| Вегетаційний період, днів | 88 | 94 | 99 |
| Висота рослин, см | 80,3 | 92,9 | 97,0 |
| Маса 1000 зерен, г | 38,5 | 41,1 | 42,7 |
| Стійкість до, бал: | | | |
| Полягання | 9,0 | 9,0 | 8,8 |
| Осіпання | 9,0 | 9,0 | 8,8 |
| Посухи | 7,0 | 7,9 | 8,1 |
| Борошнистої роси | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Гнилі кореневої | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Бурої іржі | 9,0 | 8,7 | 9,0 |
| Фузаріозу | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Вміст білка, % | 14,8 | 13,0 | 13,5 |
| Напрямок використання | зерно | зерно | зерно |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Полісся.