

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare L.*

Заявка № 13020022 Назва сорту: Дорінка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160365

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1 | Рослина: габітус | напівпрямий | 3 |
| 2 | Нижні листки: опушення піхви | відсутнє | 1 |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | наявне | 9 |
| 4 | Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок | помірне | 5 |
| 5 | Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком | мало | 3 |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | сильний | 7 |
| 7 | Початок колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів) | пізнє | 7 |
| 8 | Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків | наявне | 9 |
| 9 | Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків | сильне | 7 |
| 10 | Колос: восковий наліт | помірний | 5 |
| 11 | Колос: положення у просторі | напівпрямe | 3 |
| 12 | Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками) | середня | 5 |
| 13 | Колос: кількість рядів | два | 1 |
| 14 | Колос: форма | циліндрична | 5 |
| 15 | Колос: за щільністю | нештаний | 3 |
| 16 | Колос: за довжиною (без остюків) | середній | 2 |
| 17 | Остюки: за довжиною (порівняно з колосом) | довші | 3 |
| 18 | Стрижені колоси: довжина першого сегменту | короткий | 3 |
| 19 | Стрижені колоса: вигин першого сегменту | помірний | 5 |
| 20 | Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) | паралельне | 1 |
| 21 | Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки | довша | 3 |
| 22 | Зернівка: довжина волосків основної щетинки | довгі | 2 |
| 23 | Зернівка: наявність плівки | наявна | 9 |
| 24 | Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 25 | Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 26 | Зернівка: опущення центральної борізди | відсутнє | 1 |
| 27 | Зернівка: розташування лодикул | охоплююче | 2 |
| 28 | Зернівка: забарвлення алейронового шару | слабко забарвлена | 2 |
| 29 | Тип розвитку | ярий | 3 |
| 30 | Колос: остюки | наявні | 9 |
| 31 | Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення | остюки | 5 |
| 32 | Зернівка: форма | видовжено-еліптична | 5 |
| 33 | Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски | тонкозморшкувата | 1 |
| 34 | Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опущення зовнішньої квіткової луски | відсутнє | 9 |
| 35 | Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка | поступовий | 2 |
| 36 | Вушка: форма верхівки | загострена | 2 |
| 37 | Вушка: охоплення соломини | перекриваюче | 3 |
| 38 | Язичок: ступінь виявлення | середній | 5 |
| 39 | Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом) | слабко виповнена | 3 |
| 40 | Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) | наявна | 9 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|--|----------|----------|----------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 24,5 | 40,0 | 39,0 |
| Гарантована прибавка до усеред. урож.: | | | |
| ц/га | - 3,8 | - 2 | 2,9 |
| % | - 13 | - 5 | 8 |
| Вегетаційний період, днів | 85 | 87 | 94 |
| Висота рослин, см | 55,4 | 62,1 | 64,3 |
| Маса 1000 зерен, г | 47,0 | 49,0 | 51,3 |
| Стійкість до, бал: | | | |
| Полягання | 9,0 | 8,7 | 8,6 |
| Осипання | 9,0 | 8,9 | 8,8 |
| Посухи | 8,3 | 8,3 | 8,0 |
| Гельмінтоспоріозу | 8,1 | 8,3 | 8,1 |
| Сажки | 9,0 | 8,9 | 8,6 |
| Борошнистої роси | 8,2 | 8,6 | 7,9 |
| Вміст білка, % | 12,8 | 12,0 | 11,8 |
| Вирівняність зерна | 94,7 | 97,8 | 96,9 |
| Напрям використання | зерновий | зерновий | зерновий |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся.