

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка №: 14110008 **Назва сорту:** Медора

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

12.10.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151052

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластинка: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	тупа	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	дуже слабка	1
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	ознака не визначалась	0
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи плоду	гостра	2
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	дуже коротка	1
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	відсутні	1
35	Плід: розмір горбочків	ознака не визначалась	0
36	Плід: довжина смужок	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1
40	Плід: щільність плям	помірно	5
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелений	3
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	помірно стійкий	2
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	помірно стійкий	2
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (<i>CVYV</i>)	наявна	9
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (<i>ZYMV</i>)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 46 діб, період плодоношення 120 діб, вміст сухої речовини в плоді 4,1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.