

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка №: 13110011 Назва сорту: ПАНАНДРА

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

12.10.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151049

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індегермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластина: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластина: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластина: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластиинки	помірне	5
7	Листкова пластина: форма верхівки верхньої лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластина: пухирчастість	помірна	5
10	Листок: хвилястість країв	помірна	2
11	Листкова пластина: зубчастість країв	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноеціність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	бліле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	малий	3
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	велике	7
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	дуже коротка	1
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стигlosti	зелене	3
26	За винятком більш сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав'язі	світло-коричневе	2
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малі	3
36	Плід: довжина смужок	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плямистість	наявна	9
38	Плід: характер поширення плям	лише смугами	1
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1
40	Плід: щільність плям	дуже нещільно	1
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: довжина плодоніжки	коротка	3
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стигlosti	жовтий	2
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	сприйнятливий	1
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	високо стійкий	3
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	наявна	9
49	Стійкість до віруса поховтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Вміст сухої речовини в плоді 2,7%, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стигlosti 40 діб, період плодоношення 70 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.