

Вид: Люпин жовтий *Lupinus luteus* L.

Заявка №: 10057001 Назва сорту Ярило

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.04.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150994

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Зерно: гірка речовина	відсутня	1
2	Рослина: за висотою у вегетативній стадії	низька	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення (у фазі бутонізації)	помірне	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення (у фазі бутонізації)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння	низька	3
7	Центральний листок: за довжиною	короткий	3
8	Центральний листок: за шириною	вузький	3
9	Квітка: колір крил	світло-жовтий	6
10	Квітка: забарвлення кінчика човника	синьо-чорне	2
11	Рослина: тип росту	детермінантний	1
12	Біб: час настання зеленої стиглості	середній	5
13	Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від поверхні ґрунту до першого суцвіття)	низька	3
14	Рослина: за висотою у зеленій стиглості	низька	3
15	Біб: за довжиною	середній	5
16	Час досягання	середній	5
17	Зерно: орнаментация	наявна	9
18	Зерно: забарвлення орнаментации	ознака не визначалась	0
19	Зерно: розподіл орнаментации	ознака не визначалась	0
20	За винятком сортів з бровою. Зерно: щільність орнаментации	ознака не визначалась	0
21	Зерно: маса 100 шт.	середня	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га		35,8	48,5
Гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га		1,6	-1,8
Гарантована прибавка до нац.стандарту, %		4,6	-3,5
Урожайність насіння, ц/га		14,2	14
Вегетаційний період, днів		66	73
Стійкість до, вилягання, бал		9,0	8,2
Стійкість до осипання, бал		9,0	8,2
Стійкість до посухи, бал		8,9	7,4
Стійкість до антракнозу, бал		9,0	8,2
Стійкість до фузаріозу, бал		9,0	8,6
Залистяність, %		57,9	54,2
Вміст сирого протеїну в зеленій масі, %		18,8	18,6
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп