

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 13040008 **Назва сорту:** ДК Імарет КЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151175

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	короткий	3
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	17,8	36,5	21,2
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-0,6	7,5	-5,1
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-3	26	-20
Маса 1000 насінин, г	3,8	4,9	4,6
Висота рослин, см	124	140,3	116,9
Стійкість до вилягання, бал	7,9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7,1	8,4	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,4	7	7,8
Перезимувало рослин, бал	7,6	8,7	8,3
Днів до досягання	286	289	308
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,6	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,6	9	8
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,6	9	9
Вміст білка, %	23,4	21	19,8
Вміст олії, %	46,2	48,9	50
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,5	0,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.