

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*
Заявка №: 09016107 **Назва сорту** Мінотавр

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.09.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151037

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	23,2	27,7	23,2
Прибавка до національного стандарту, ц/га	0,3	0,6	-1,3
Прибавка до національного стандарту, %	1,3	2,2	-5,3
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	1,8	-0,4	-3,9
Прибавка до умовного стандарту, %	8,4	-1,4	-14,4
Стійкість до вилягання, бал	8,2	9,0	8,7
Стійкість до посухи, бал	7,7	7,6	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,7	7,2	7,3
Зимостійкість, бал	6,5	7,3	8,4
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	9,0	9,0	8,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	23,7	22,8	21,4
Вміст жиру, %	44,1	44,5	45,0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,0	0,0	0,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп