

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 13040017 Назва сорту: ЕС ДАРКО

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

12.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160228

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,4	37	21,7
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	2,9	8	-4,6
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	16	28	-18
Маса 1000 насінин, г	4,2	5,4	5,1
Висота рослин, см	122	140,4	123
Стійкість до вилягання, бал	9	8,4	9
Стійкість до посухи, бал	8	8,4	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,5	7	7,5
Перезимувало рослин, бал	7,3	8,5	8,3
Днів до досягання	288	287	307
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,5	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,5	9	8
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,5	9	9
Вміст білка, %	23	21,2	20
Вміст олії, %	46,7	48,5	49,7
Вміст глюкозинолатів, %	0,9	0,7	0,8
Вміст ерукової кислоти, %	0,2	0,1	0,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.