

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 12016049 Назва сорту: ЕС ОДІС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

12.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160227

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за ширину (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тілки з частковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,8	34,6	22,1
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	0,4	5,6	-4,2
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	2	20	-16
Маса 1000 насінин, г	4,1	5,3	4,7
Висота рослин, см	116	131,3	121,3
Стійкість до вилягання, бал	8,3	8,8	9
Стійкість до посухи, бал	6,8	8,1	8,7
Стійкість до осипання, бал	7,1	7	6,9
Перезимувало рослин, бал	7,8	8,4	8,2
Днів до досягнання	290	293	310
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,8	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,8	9	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,8	9	8,7
Вміст білка, %	23	21,9	20,3
Вміст олії, %	46,4	47,9	49,4
Вміст глукозинолатів, %	0,6	0,5	0,5
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.