

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 12016001 Назва сорту: ПТ218

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160453

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	світлий	3
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за ширину (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тілки з частковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	пізній	7
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,5	34,2	19
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	0	5,2	-7,3
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	0	18	-28
Маса 1000 насінин, г	4,1	4,7	4,5
Висота рослин, см	119,3	125,2	118,7
Стійкість до вилягання, бал	8,3	8,8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8,8
Стійкість до осипання, бал	7	7	7
Перезимувало рослин, бал	7,5	8,5	7,9
Днів до досягнання	291	293	311
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,8	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	9	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,5	9	9
Вміст білка, %	23,7	21,9	20,7
Вміст олії, %	46,2	48	49,1
Вміст глукозинолатів, %	0,8	0,7	0,8
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.