

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 11016057 Назва сорту: ПТ228КЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160450

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 1 | Насіння: ерукова кислота | відсутня | 1 |
| 2 | Сім'ядоля: за довжиною | середня | 5 |
| 3 | Сім'ядоля: за шириною | середня | 5 |
| 4 | Листок: інтенсивність зеленого кольору | помірний | 5 |
| 5 | Листок: наявність часток | наявні | 9 |
| 6 | Листок: кількість часток (повний розвиток листка) | середня кількість | 5 |
| 7 | Листок: зубчастість краю | помірна | 5 |
| 8 | Листок: за довжиною (пластинка і черешок) | середній | 5 |
| 9 | Листок: за шириною (у найширшому місці) | середній | 5 |
| 10 | Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка | середній | 5 |
| 11 | Рослина: час цвітіння | середній | 5 |
| 12 | Квітка: колір пелюсток | жовтий | 3 |
| 13 | Квітка: довжина пелюсток | короткі | 3 |
| 14 | Квітка: ширина пелюсток | середні | 5 |
| 15 | Рослина: утворення пилку | наявне | 9 |
| 16 | Рослина: за висотою (за повного цвітіння) | висока | 7 |
| 17 | Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно) | довга | 7 |
| 18 | Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем) | середній | 5 |
| 19 | Стручок: довжина зубця | середній | 5 |
| 20 | Стручок: довжина ніжки | середня | 5 |
| 21 | Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 22 | Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби | ознака не визначається | 0 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 18,2 | 31,3 | 19,5 |
| ± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га | -0,3 | 2,4 | -6,9 |
| ± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, % | -2 | 8 | -26 |
| Маса 1000 насінин, г | 4,1 | 4,5 | 4,6 |
| Висота рослин, см | 114,8 | 123,6 | 115,7 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 8,8 | 9 |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 8 | 8,8 |
| Стійкість до осипання, бал | 7,3 | 7 | 7,5 |
| Перезимувало рослин, бал | 7,3 | 8,2 | 8,3 |
| Днів до досягання | 290 | 302 | 311 |
| Стійкість до пильщика ріпакового, бал | 8,8 | 9 | 9 |
| Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал | 8 | 9 | 7,7 |
| Стійкість до бактеріозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість до пероноспорозу, бал | 8,8 | 9 | 9 |
| Вміст білка, % | 23 | 21,2 | 19,1 |
| Вміст олії, % | 46,7 | 48,6 | 50,4 |
| Вміст глюкозинолатів, % | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Вміст ерукової кислоти, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.