

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 12016072 Назва сорту: ПТ231

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 21.03.2016 Патент № 160141

Дата пріоритету: 13.12.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160455

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузкий	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	ознака не визначалась	0
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20,1	36,3	19,3
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	1,7	7,4	-7,1
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	9	25	-27
Маса 1000 насінин, г	3,9	5,1	4,6
Висота рослин, см	118,8	147,8	125
Стійкість до вилягання, бал	8,1	8,3	9
Стійкість до посухи, бал	7,3	8,3	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,2	7	7,5
Перезимувало рослин, бал	7,2	8,5	7,5
Днів до досягання	286	303	308
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,6	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,6	9	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,6	9	8,3
Вміст білка, %	21,8	20,6	18,7
Вміст олії, %	48	49,2	51
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.