

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 12016031

Назва сорту: Торонто

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160225

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за ширину (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тілки з частковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник С	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,6	30,2	21,1
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	1,2	1,3	-5,3
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	6	4	-20
Маса 1000 насінин, г	3,9	5,2	4,8
Висота рослин, см	115,3	127,6	114,7
Стійкість до вилягання, бал	8,6	8,8	9
Стійкість до посухи, бал	6,7	7,7	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,4	7,2	7,5
Перезимувало рослин, бал	7	7,7	7,7
Днів до досягнання	289	293	309
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,8	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	9	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,8	9	9
Вміст білка, %	23,3	21,2	20
Вміст олії, %	46,5	48,6	49,9
Вміст глукозинолатів, %	0,7	0,7	0,8
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.