

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 12018006 Назва сорту Авантюрин

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.07.2015 Патент №: 150600

Дата пріоритет 07.12.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.07.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151039

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостреноїцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	округло-видовжена	5
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4
18	Насіння: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	16,7	22,6	19,8
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-1,8	2,7	0,5
Прибавка до національного стандарту, %	-9,7	13,6	2,6
Маса 1000 насінин, г	164	169,2	176,6
Висота рослин, см	57,4	57,5	64,6
Стійкість проти, бал:			
- вилягання	9,0	9,0	9,0
- осипання	8,9	8,6	9,0
- засухи	8,0	8,6	9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,0	10,5	11,2
Стійкість проти, бал:			
- аскохітозу	9,0	9,0	9,0
- бактеріозу	9,0	9,0	9,0
- септоріозу	9,0	9,0	9,0
- фузаріозу	9,0	9,0	9,0
- пероноспорозу	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	39,5	40,0	38,6
Вміст олії, %	22,6	21,0	20,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп