

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка №: 10012006 Назва сорту Щедрик

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.04.2015 Патент №: 150277

Дата пріоритет 08.10.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.04.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150959

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабке	3
5	Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком	середньо	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабке	3
10	Колос: восковий наліт	сильний	7
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5
12	Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для пливчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц / га	30,1	40,2	32,9
Гарантована прибавка, +/- до нац.ст. ц/га	4,3	0,9	-1,2
%	16,6	2,2	-3,5
Вегетаційний період, дн.	80	80	87
Висота рослин, см	60,5	65,7	67,5
Маса 1000 насінин, г	45,9	47,8	46,6
Стійкість до :			
- вилягання	8,9	8,2	8,3
- осипання	8	8,3	8,5

- посухи	8,3	8,2	7,8
- гельмінтоспориозу	8,3	8,2	7,8
- сажки	9	8,9	8,6
- борошнистої роси	8,3	8,6	7,5
Якісні характеристики:			
- вміст білку, %	14,8	14,5	12,9
- вирівняність зерна, %	92,4	97,1	97,2
напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ