

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.

Заявка №: 08024009 Назва сорту Котигорошок

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №: 110092

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.09.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150966

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	ознака не визначалась	0
3	Стебло: фасціація	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	середнє	5
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня кількість	5
6	Листя: забарвлення	зелене	2
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листя: (озн. 6, стан 2): Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
8	Листок: вторинні листочки	відсутні	1
9	Листок: кількість вторинних листочків	ознака не визначалась	0
10	Вторинний листочок: за розміром	ознака не визначалась	0
11	Вторинний листочок: за довжиною	ознака не визначалась	0
12	Вторинний листочок: за шириною	ознака не визначалась	0
13	Вторинний листочок: положення найширшої частини	ознака не визначалась	0
14	Вторинний листочок: зубчастість	ознака не визначалась	0
15	Прилисток: за довжиною	середній	5
16	Прилисток: за шириною	середній	5
17	Прилисток: за розміром	ознака не визначалась	0
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	ознака не визначалась	0
19	Прилисток: частина під пазухою за довжиною	ознака не визначалась	0
20	Прилисток: плямистість	відсутня	1
21	Прилисток: щільність плямистості	ознака не визначалась	0
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листка чи вусика	ознака не визначалась	0
23	Лише сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначалась	0
24	Час цвітіння	пізній	7
26	Лише сорти з антоціаном. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначалась	0
27	Лише сорти без антоціану. Квітка: колір паруса	білий	1
28	Квітка: ширина паруса	середня	5
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1
31	Квітка: ширина чашолистка	середня	5
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	загострена	2
33	Квітконіжка: за довжиною	ознака не визначалась	0
34	Квітконіжка: відстань від стебла до першого бобу	середня	5
35	Квітконіжка: відстань між першим і другим бобом	ознака не визначалась	0
36	Квітконіжка: кількість приквітків	ознака не визначалась	0
37	Біб: за довжиною	середній	5
38	Біб: за шириною	широкий	7
39	Біб: пергаментність	відсутня або часткова	1
40	За винятком пергаментних сортів. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2
42	Біб: ступінь вигину	відсутній або дуже слабкий	1
43	Біб: колір	зелений	2
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (Озн. 43: стан 2): інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
45	За винятком пергаментних сортів. Біб: волокна шва	ознака не визначалась	0
46	Біб: кількість насінних зачатків	середня кількість	5
47	Не стигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
48	Насінина: загальна форма	ромбовидна	3
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкватість сім'ядолей	ознака не визначалась	0

51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: ступінь зморшкуватості	ознака не визначалась	0
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1
53	Лише сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної шкірки	ознака не визначалась	0
54	Лише сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці	ознака не визначалась	0
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінної шкірки	1
56	Лише сорти з антоціаном: Насінина: забарвлення насінної шкірки	ознака не визначалась	0
57	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
58,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Pasa 1	ознака не визначалась	0
58,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Pasa 5	ознака не визначалась	0
58,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Pasa 6	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до <i>Ascochyta pisi</i> , Race C	ознака не визначалась	0
61	Стійкість до <i>Erysiphe communis</i> Syd.	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 67 діб. Урожайність ранньої продукції становить 5,3 т/га, загальної - 19,7 т/га із вмістом сухої речовини в зерні 22,4 % та загального цукру - 5,43 %. Ураженість аскохітозом - 3 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся.