

Вид: Овес голозерний Avena nuda L.

Заявка №: 13520001 Назва сорту Дієтичний

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.07.2015 Патент №: 150538

Дата пріоритет 03.01.2013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.05.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150905

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	прямий	1
2	Найнижчі листки: опушеність пластинки	слабка	3
3	Листкова пластинка: опушеність країв листка	відсутня або дуже слабка	1
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	відсутні або дуже рідко	1
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	ранній	3
6	Стебло: опушеність найвищого вузла	відсутня	1
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	ознака не визначалась	0
8	Волоть: орієнтація гілочок	стисла	2
9	Волоть: положення гілочок	напівпряме	3
10	Волоть: положення вторинних колосків	пряме	1
11	Колоскові луски: сіруватість	відсутня або дуже слабка	1
12	Колоскові луски: за довжиною	середні	5
13	Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски	відсутня	1
14	Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	ознака не визначалась	0
15	Рослина: за висотою	середня	5
16	Волоть: за довжиною	середня	5
17	Зернівка: плівка	відсутня	1
18	Первинна зернівка: тенденція до остистості	відсутня або дуже слабка	1
19	Первинна зернівка: довжина нижньої квіткової луски	середня	5
20	Зернівка: колір нижньої квіткової луски	білий	1
21	Первинне зерно: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1
22	Первинна зернівка: опушення основи	помірне	5
23	Первинна зернівка: довжина базальних волосків	середні	5
24	Первинна зернівка: довжина стрижня другої зернівки	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Сорт ранньостиглий, урожайність насіння – 4,95 т/га, вміст білка – 19,4%, жиру – 3,33%. Стійкість до обсипання та посухостійкість – 9 балів, стійкість до гельмінтоспориозу, борошнистої роси, твердої та летючої сажки, стеблової іржі, аскохітозу, бактеріальної та бурої плямистості – 9 балів; стійкість до заселення внутрішньостебловими шкідниками – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Лісостеп, Полісся.