

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 12016061 Назва сорту: Доджер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160230

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1 | Насіння: ерукова кислота | відсутня | 1 |
| 2 | Сім'ядоля: за довжиною | середня | 5 |
| 3 | Сім'ядоля: за шириною | середня | 5 |
| 4 | Листок: інтенсивність зеленого кольору | помірний | 5 |
| 5 | Листок: наявність часток | наявні | 9 |
| 6 | Листок: кількість часток (повний розвиток листка) | середня кількість | 5 |
| 7 | Листок: зубчастість краю | помірна | 5 |
| 8 | Листок: за довжиною (пластинка і черешок) | середній | 5 |
| 9 | Листок: за шириною (у найширшому місці) | середній | 5 |
| 10 | Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка | середній | 5 |
| 11 | Рослина: час цвітіння | середній | 5 |
| 12 | Квітка: колір пелюсток | жовтий | 3 |
| 13 | Квітка: довжина пелюсток | середні | 5 |
| 14 | Квітка: ширина пелюсток | середні | 5 |
| 15 | Рослина: утворення пилку | наявне | 9 |
| 16 | Рослина: за висотою (за повного цвітіння) | середня | 5 |
| 17 | Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно) | середня | 5 |
| 18 | Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем) | середній | 5 |
| 19 | Стручок: довжина зубця | середній | 5 |
| 20 | Стручок: довжина ніжки | середня | 5 |
| 21 | Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби | ознака не визначається | 0 |
| 22 | Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби | відсутня або дуже слабка | 1 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|------------------------------------|----------|------|------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 8 | 21,2 | 15,4 |
| ± до усередненої урожайності, ц/га | -6,6 | 1,6 | -4,5 |
| ± до усередненої урожайності, % | -45 | 8 | -23 |
| Маса 1000 насінин, г | 3,5 | 3,8 | 3,4 |
| Висота рослин, см | 93 | 116 | 114 |
| Стійкість до: | | | |
| - вилягання | 9 | 9 | 9 |
| - осипання | 6,7 | 7,7 | 8,8 |
| - поасухи | 7,6 | 7 | 7,3 |
| - пильщика ріпакового | 9 | 9 | 9 |
| - ріпакового квіткоїду | 9 | 8,8 | 8 |
| - бактеріозу | 9 | 9 | 9 |
| - пероноспорозу | 9 | 9 | 9 |
| Вміст, %: | | | |
| - білка | 26 | 25,1 | 24 |
| - олії | 43,9 | 45,6 | 45,8 |
| - глюкозинолатів | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| - ерукової вислоти | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.