

Вид: Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L.

Заявка №: 14113022 Назва сорту Маранелло

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.07.2015 Патент №: 150384

Дата пріоритет 25.11.2014

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

16.06.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150916

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: довжина головного стебла	коротке	3
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: довжина пластинки	довга	7
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	сильна	7
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3
18	Листок: глянуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	похиле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірне	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	дуже великий	9
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірне	5
35	Плід: глянуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина у плодоніжці	наявна	9
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	глибока	7
38	Плід: форма верхівки	притиснута	4
39	Плід: глибина борозенок між частками	помірні	5
40	Плід: кількість часток	переважно чотири і більше	5
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	довга	7
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	ранній	3
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	відсутня	1
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	відсутня	1
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1

49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	наявна	9
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	відсутня	1
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	наявна	9
50	Стійкість до Phytophthora capsici	відсутня	1
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня маса плоду 220 г, вміст сухої речовини 7,8%, тривалість періоду до досягання 70 діб, товщина стінки плоду 8 мм, вміст загального цукру 5,4%, вміст клітковини 1,4%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт.