

Вид: Стоколос безостий *Bromopsis inermis* (Leys.) Holub

Заявка №: 09065001 **Назва сорту** Іванко

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.03.2015 **Патент №:** 150178

Дата пріоритет 16.10.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

13.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150969

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоідність	ознака не визначалась	0
2	Сіянець: антоціанове забарвлення піхви листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Рослина: за габітусом	напівпрямостояча	3
4	Рослина: природна висота (висота основної зеленої маси)	середня	5
5	Рослина: ширина прапорцевого листка	середня	5
6	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірне	5
7	Рослина: сіро-зелене забарвлення листка	відсутнє	1
8	Рослина: схильність до колосіння	відсутня або дуже мала	1
9	Рослина: габітус	напівпрямостоячий	3
10	Рослина: справжня висота (висота основної зеленої маси)	низька	3
11	Рослина: справжня висота	середня	5
12	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірне	5
13	Рослина: сіро-зелене забарвлення листка	відсутнє	1
14	Рослина: опушення листкової піхви	наявне	9
15	Рослина: довжина найдовшого стебла	середнє	5
16	Стебло: довжина верхнього міжвузля	середнє	5
17	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5
18	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5
19	Прапорцевий листок: за розміром	середній	5
20	Прапорцевий листок: за формою	середній	5
21	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
22	Суцвіття: за щільністю	нешільне	3
23	Суцвіття: антоціанове забарвлення півок	відсутнє або дуже слабке	1
24	Час колосіння	помірний	5
25	Динаміка колосіння	помірне	5
26	Схильність до колосіння після скошування	мала	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність сухої речовини 6,6 т/га. Вегетаційний період – 63 доби. Стійкість до вилягання 8,8 бала, до посухи – 7,8 балів. Зимостійкість – 6,3 бала, кущистість – 6,8 балів, залистянність – 55,8%. Вміст сирого протеїну в сухій речовині 10,7%, клітковини – 29,4%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Полісся