

Вид: Капуста цвітня Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

Заявка №: 09029003 **Назва сорту** Фронтіна

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

08.09.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150968

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Зовнішнє стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5
4	Листок: положення	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	короткий	3
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширина/довжина	ознака не визначалась	0
8	Листок: часточковість	наявна	9
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	помірне	5
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: зморшкуватість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: за діаметром	середня	5
19	Головка: форма позадвжнього розрізу	округла	1
20	За винятком сортів з трикутною головою: Головка: утворення склепіння	помірне	5
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	слабка	3
23	Головка: текстура	ніжна	3
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	ознака не визначалась	0
26	Час досягання за весняного садіння	пізній	7
27	Час досягання за літнього садіння	пізній осінній тип	7
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 27 т/га; Період від повних сходів до початку досягання 115 діб; Період плодоношення 18 діб; Вміст сухої речовини 9,7% Вміст загального цукру 2,4%; Вміст вітаміну С 92,7 мг%; Вміст білка 2,5%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся