

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка №** 14045003 **Назва сорту:** Аделіна

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 15.03.2016 **Патент №** 160161

**Дата пріоритету:** 14.01.2014

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.02.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160281

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення                                    | Код |
|----|--|---|-----|
| 1  | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення  | наявне  | 9   |
| 2  | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення                              | середня                                       | 5   |
| 3  | Рослина: тип росту   | від напівдетермінантного до індетермінантного | 3   |
| 4  | Рослина: форма росту   | від прямої до напіврозлогої                   | 2   |
| 5  | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)              | рудувато-коричневе                            | 2   |
| 6  | Рослина: за висотою  | середня                                       | 5   |
| 7  | Листок: пухирчатість   | помірна                                       | 5   |
| 8  | Листок: форма бічного листочка (складного листка)                                | загостренояйцевидна                           | 3   |
| 9  | Листок: розмір бічного листочка  | середній                                      | 5   |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення                                       | помірне                                       | 5   |
| 11 | Квітка: забарвлення  | фіолетове                                     | 2   |
| 12 | Біб: інтенсивність коричневого забарвлення                                       | помірне                                       | 5   |
| 13 | Насіння: маса 1000 шт.   | середня                                       | 5   |
| 14 | Насінина: форма  | видовжена                                     | 3   |
| 15 | Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)                    | жовте   | 1   |
| 16 | Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці        | ознака не визначалась                         | 0   |
| 17 | Насінина: забарвлення рубчика  | темно-коричневе                               | 4   |
| 18 | Насінина: забарвлення сім'янки рубчика   | як у насінній оболонки                        | 1   |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | від дуже раннього до раннього                 | 2   |
| 20 | Рослина: час досягання   | від дуже раннього до раннього                 | 2   |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник                              | Значення |       |       |
|---------------------------------------|----------|-------|-------|
|                                       | С        | Л     | П     |
| Урожайність, ц/га                     | 9,6      | 20,7  | 21,1  |
| ± до усередненої урожайності, ц/га    | -8,7     | -2,5  | -0,4  |
| ± до усередненої урожайності, %       | -48      | -11   | -2    |
| Маса 1000 насінин, г                  | 130,1    | 160,2 | 148,6 |
| Висота рослин, см                     | 75       | 82    | 88    |
| Стійкість до, бал:                    |          |       |       |
| - вилягання                           | 9        | 9     | 8,4   |
| - осипання                            | 7,4      | 8,3   | 9     |
| - посухи                              | 7,7      | 8,3   | 8,8   |
| Висота прикріплення нижнього бобу, см | 9,9      | 12,8  | 14,3  |
| Стійкість проти, бал:                 |          |       |       |
| - пероноспорозу                       | 9        | 8,9   | 9     |
| - аскохітозу                          | 8,4      | 8,7   | 8,9   |
| - бактеріозу                          | 8,6      | 8,5   | 8,3   |
| - септоріозу                          | 8,4      | 9     | 9     |
| - фузаріозу                           | 9        | 8,7   | 9     |
| Вміст білка, %                        | 41,2     | 40,3  | 39,1  |
| Вміст олії, %                         | 23,4     | 22,1  | 21,5  |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Полісся.