

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 14045002 **Назва сорту:** СГ Айдер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.03.2016 **Патент №** 160160

Дата пріоритету: 14.01.2014

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160280

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: форма росту	від прямої до напіврозлогої	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояйцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінної оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від середнього до пізнього	6
20	Рослина: час досягання	від середнього до пізнього	6

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	13,1	23,7	
± до усередненої урожайності, ц/га	-5,9	0,2	
± до усередненої урожайності, %	-31	1	
Маса 1000 насінин, г	146,4	173,4	
Висота рослин, см	77	86	
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9	9	
- осипання	9	9	
- посухи	7,4	8,6	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	13	12,3	
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9	9	
- аскохітозу	9	9	
- бактеріозу	9	8,6	
- септоріозу	9	9	
- фузаріозу	9	9	
Вміст білка, %	42,2	41,5	
Вміст олії, %	21,3	20,4	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.