

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 12013019 Назва сорту: CP769

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

25.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160507

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|------------------------|-----|
| 1 | Клубочок: тип ростковості | одноростковий | 1 |
| 2 | Рослина: плоідність | диплоїд | 2 |
| 3 | Паросток: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
| 4 | Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення | ознака не визначалась | 0 |
| 5 | Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50 %) | зелене | 2 |
| 6 | Рослина: тип розетки | розлога | 5 |
| 7 | Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) | короткий | 3 |
| 8 | Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) | середній | 5 |
| 9 | Листок: розмір пластинки | середня | 5 |
| 10 | Листкова пластинка: за довжиною | коротка | 3 |
| 11 | Листкова пластинка: за шириною | широка | 7 |
| 12 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
| 13 | Листкова пластинка: хвилястість країв | слабка | 3 |
| 14 | Листкова пластинка: характер поверхні | помірно гофрована | 5 |
| 15 | Листкова пластинка: блиск | помірний | 5 |
| 16 | Листкова пластинка: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
| 17 | Листкова пластинка: форма верхівки | гостра | 1 |
| 18 | Черешок: за шириною | середній | 5 |
| 19 | Черешок: колір | зелений | 2 |
| 20 | Черешок: забарвлення основи | білувато-зелене | 1 |
| 21 | Рослина: квітконосні стебла | відсутні | 1 |
| 22 | Час початку розвитку квітконосного стебла | ознака не визначається | 0 |
| 23 | Коренеплід: за розміром | середній | 5 |
| 24 | Коренеплід: за довжиною | середній | 5 |
| 25 | Коренеплід: форма | широко конічна | 3 |
| 26 | Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт | повністю заглиблений | 3 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|--|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Збір цукру, ц/га | 95,8 | 103,0 | 79,8 |
| + , - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га | 10,4 | 15,4 | -10,1 |
| + , - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, % | 12,2 | 17,6 | -11,2 |
| Урожайність, ц/га | 488,3 | 549,1 | 424,1 |
| Цукристість, % | 19,7 | 18,7 | 18,5 |
| Вихід цукру, % | 16,9 | 15,9 | 15,7 |
| Вихід цукру, ц/га | 82,6 | 87,4 | 66,6 |
| + , - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га | 11,0 | 11,9 | -13,4 |
| + , - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, % | 15,4 | 15,8 | -16,8 |
| Вміст розчинної золи, % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Втрати цукру в мелясі, % | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ураженість коренейдом, бал | 1,0 | 1,1 | 2,2 |
| Стійкість до церкоспорозу, бал | 8,0 | 7,2 | 4,2 |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.