

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 13088001 Назва сорту: BIBIAHA

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

16.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160682

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	відкрита	5
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхікові і бічні листочки: частота зрошення	рідко	3
23	Листочек: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочек: глибина жилок	середнє	5
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	не глянсуватий	3
26	Листочек: опушеність пластиинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	помірне	5
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	середнє	2
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5
36	Рослина: час достигання	ранній	3
37	Бульба: форма	видовженоовальна	4
38	Бульба: глибина вічок	мілкі	3
39	Бульба: колір шкірки	світло-бежевий	1
40	Бульба: забарвлення основи вічка	бліле	1
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	108,7	241,3	194
+,- до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-16,6	3,6	-77,4
+,- до усередненої урожайності за 5 попередніх років, %	13	2,0	-29
Вміст крохмалю, %	10,6	15,4	13,8
Збір крохмалю, ц/га	12,6	34,7	24,7
Вміст сухої речовини, %	17,8	23,5	23,4
Діб, від повних сходів до всихання бадилля	73	76	54
Маса бульб, г	74	90	68
Смакові якості, бал	4	6	6
Товарність бульб, %	79	84	85
Лежкість, бал	-	9	9
Стійкість до пошкодження нематодою	С.Т.	С.Т.	С.Т.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	С.Т.	С.Т.	С.Т.
Якість	Н.К.	С.К.	С.К.
Напрям використання	СТЛ	СТЛ	СТЛ

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.