

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 13088013 Назва сорту: ВОЛАРЕ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160309

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опущення основи	слабке	3
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опущення верхівки	слабке	3
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	середні	5
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	часто	7
23	Листочек: хвильастість краю	помірна	5
24	Листочек: глибина жилок	середнє	5
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	помірно глянсуватий	5
26	Листочек: опущеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	помірне	5
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5
36	Рослина: час достигання	середній	5
37	Бульба: форма	куляста	1
38	Бульба: глибина вічок	мілкі	3
39	Бульба: колір шкірки	світло-бежевий	1
40	Бульба: забарвлення основи вічка	бліле	1
41	Бульба: забарвлення м'якоті	бліле	1
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	слабке	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	279,9	169,3	
+/- до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га	52,8	-80,5	
+/- до усередненої урожайності за 5 попередніх років, %	23	32	
Вміст крохмалю, %	12,1	11,4	
Збір крохмалю, ц/га	35,2	18,9	
Вміст сухої речовини, %	20,0	20,8	
Діб, від повних сходів до всихання бадилля	86	56	
Маса бульб, г	115	79	
Смакові якості, бал	6	5	
Товарність бульб, %	87	90	
Лежкість, бал	9	7	
Стійкість до пошкодження нематодою	ст.	ст.	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	ст.	ст.	
Якість	С.К.	С.К.	
Напрям використання	стл	стл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.