

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 13088011 Назва сорту: РУДОЛЬФ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160308

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|------------------------|-----|
| 1 | Світловий паросток: за розміром | середній | 5 |
| 2 | Світловий паросток: за формою | яйцеподібний | 2 |
| 3 | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи | сильна | 7 |
| 4 | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи | середнє | 2 |
| 5 | Світловий паросток: опущення основи | помірне | 5 |
| 6 | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою | середня | 5 |
| 7 | Світловий паросток: характеристика верхівки | відкрита | 5 |
| 8 | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки | сильне | 7 |
| 9 | Світловий паросток: опущення верхівки | помірне | 5 |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків | мало | 3 |
| 11 | Світловий паросток: довжина бічних пагінців | короткі | 3 |
| 12 | Рослина: тип розвитку | проміжний | 2 |
| 13 | Рослина: габітус | прямий | 3 |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення | дуже сильне | 9 |
| 15 | Листок: загальний розмір | середній | 5 |
| 16 | Листок: відкритість | відкритий | 5 |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків | сильне | 7 |
| 18 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | темне | 7 |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці | сильне | 7 |
| 20 | Друга пара бічних листочків: за розміром | середні | 5 |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за ширину | середні | 5 |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення | рідко | 3 |
| 23 | Листочек: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 24 | Листочек: глибина жилок | глибоке | 7 |
| 25 | Листочек: глянсуватість верхнього боку | глянсуватий | 7 |
| 26 | Листочек: опущеність пластинки на верхівці розетки | наявна | 9 |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення | сильне | 7 |
| 28 | Рослина: за висотою | висока | 7 |
| 29 | Рослина: рясність цвітіння | рясне | 7 |
| 30 | Суцвіття: за розміром | велике | 7 |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки | сильне | 7 |
| 32 | Віночок квітки: розмір | середній | 5 |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку | сильне | 7 |
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку | середнє | 2 |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці | велике | 7 |
| 36 | Рослина: час достигання | пізній | 7 |
| 37 | Бульба: форма | куляста | 1 |
| 38 | Бульба: глибина вічок | мілкі | 3 |
| 39 | Бульба: колір шкірки | червоний | 3 |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічка | червоне | 3 |
| 41 | Бульба: забарвлення м'якоті | помірно жовте | 4 |
| 42 | Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | ознака не визначається | 0 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|--|----------|-------|---|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 286,6 | 214,5 | |
| +,- до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га | 59,6 | -35,2 | |
| +,- до усередненої урожайності за 5 попередніх років, % | 26,0 | 14,0 | |
| Вміст крохмалю, % | 15,5 | 13,5 | |
| Збір крохмалю, ц/га | 45,0 | 29,2 | |
| Вміст сухої речовини, % | 23,0 | 24,0 | |
| Діб, від повних сходів до всихання бадилля | 91 | 58 | |
| Маса бульб, г | 112 | 82 | |
| Смакові якості, бал | 6 | 6 | |
| Товарність бульб, % | 90 | 90 | |
| Лежкість, бал | 9 | 7 | |
| Стійкість до пошкодження нематодою | ст. | ст. | |
| Стійкість до звичайного патотипу збудника раку | ст. | ст. | |
| Якість | С.К. | С.К. | |
| Напрям використання | стл | стл | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.