

Вид: Гарбуз звичайний *Cucurbita pepo* L.

Заявка № 12102002 Назва сорту: РУЖ Віф Де ТАМП

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151068

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №    | Ознака   | Проявлення              | Код |
|------|--|-------------------------|-----|
| 1    | Паросток: форма сім'ядолей   | широколіптична          | 3   |
| 2    | Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей  | свіtle                  | 3   |
| 3    | Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі   | пряма                   | 2   |
| 4    | Рослина: габітус   | плетистий               | 3   |
| 5    | Рослина: галуження   | наявне                  | 9   |
| 6    | Рослина: галуження стебла  | помірне                 | 5   |
| 7    | Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)                | ознака не визначається  | 0   |
| 8    | Стебло: забарвлення  | цілком зелене           | 1   |
| 9    | Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення   | свіtle                  | 3   |
| 10   | Стебло: крапчастість   | відсутня                | 1   |
| 11   | Стебло: вусики   | добре розвинені         | 2   |
| 12   | Листкова пластина: за розміром   | середня                 | 5   |
| 13   | Листкова пластина: розсіченість  | відсутня або дуже мілка | 1   |
| 14   | Листкова пластина: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку   | свіtle                  | 3   |
| 15   | Листкова пластина: срібляста плямистість   | відсутня                | 1   |
| 16   | Листкова пластина: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю   | ознака не визначається  | 0   |
| 17   | Черешок: за довжиною   | середній                | 5   |
| 18   | Черешок: кількість шилів   | середня кількість       | 5   |
| 19   | Жіноча квітка: кільце всередині віночка  | відсутнє                | 1   |
| 20   | Жіноча квітка: забарвлення кільца всередині віночка  | ознака не визначається  | 0   |
| 21   | Лише сорти з зеленим забарвленням кільца всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення           | ознака не визначається  | 0   |
| 22   | Чоловіча квітка: вираження кільца всередині віночка  | відсутнє                | 1   |
| 23   | Чоловіча квітка: забарвлення кільца всередині віночка  | ознака не визначається  | 0   |
| 24   | Лише сорти з зеленим забарвленням кільца всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення         | ознака не визначається  | 0   |
| 25   | Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра                             | ознака не визначається  | 0   |
| 26   | Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма                                      | ознака не визначається  | 0   |
| 27   | Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або борозенок)                         | жовте                   | 3   |
| 28   | Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)    | дуже темне              | 9   |
| 29   | Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27) | ознака не визначається  | 0   |
| 30   | Плід: переважна форма  | поперечноеліптична      | 2   |
| 31,1 | Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною   | ознака не визначається  | 0   |
| 31,2 | Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною  | ознака не визначається  | 0   |
| 31,3 | Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною  | ознака не визначається  | 0   |
| 31,4 | Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною  | ознака не визначається  | 0   |
| 32,1 | Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр  | ознака не визначається  | 0   |
| 32,2 | Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр   | ознака не визначається  | 0   |
| 32,3 | Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр   | ознака не визначається  | 0   |
| 33,1 | Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра                                      | ознака не визначається  | 0   |
| 33,2 | Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра                                       | ознака не визначається  | 0   |
| 33,3 | Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра                                       | ознака не визначається  | 0   |
| 34,1 | Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром  | дуже великий            | 9   |
| 34,2 | Лише сорти типу Rondinі. Плід: за розміром   | ознака не визначається  | 0   |
| 35   | Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки   | ознака не визначається  | 0   |
| 36   | Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю  | ознака не визначається  | 0   |
| 37   | Лише сорти типу патисон. Плід: позиція ( положення) екваторіального краю                                       | ознака не визначається  | 0   |
| 38   | Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки  | ознака не визначається  | 0   |
| 39   | Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця   | ознака не визначається  | 0   |
| 40   | Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра   | ознака не визначається  | 0   |
| 41   | Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки   | ознака не визначається  | 0   |
| 42   | Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки  | ознака не визначається  | 0   |
| 43   | Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра                              | ознака не визначається  | 0   |
| 44   | Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки  | ознака не визначається  | 0   |
| 45   | Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця   | ознака не визначається  | 0   |
| 46   | Плід: борозенки  | наявні                  | 9   |
| 47   | Плід: глибина борозенок  | мілкі                   | 3   |
| 48   | Плід: ребра  | наявні                  | 9   |
| 49   | Плід: ступінь виявлення ребер  | помірно                 | 5   |
| 50   | Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не брати до уваги)                   | червоне                 | 8   |
| 51   | Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)            | ознака не визначається  | 0   |
| 52   | Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)           | ознака не визначається  | 0   |
| 53   | Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення                      | ознака не визначається  | 0   |
| 54   | Плід: смужки на боріздах   | відсутні                | 1   |
| 55   | Плід: забарвлення смужок на боріздах   | ознака не визначається  | 0   |

| №  | Ознака   | Проявлення             | Код |
|----|--|------------------------|-----|
| 56 | Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50)                              | однакове               | 1   |
| 57 | Плід: плямистість  | відсутня               | 1   |
| 58 | Плід: переважний розмір плям   | ознака не визначалась  | 0   |
| 59 | Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть)                               | відсутнє               | 1   |
| 60 | Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами  | ознака не визначається | 0   |
| 61 | Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами  | ознака не визначається | 0   |
| 62 | Плід: бородавки на шкірці  | відсутні               | 1   |
| 63 | Плід: кількість бородавок на шкірці  | ознака не визначається | 0   |
| 64 | Плід: розмір квіткового рубця  | великий                | 7   |
| 65 | Плід: довжина плодоніжки   | довга                  | 7   |
| 66 | Плід: забарвлення плодоніжки   | жовте                  | 1   |
| 67 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки  | ознака не визначалась  | 0   |
| 68 | Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки  | відсутня               | 1   |
| 69 | Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок не брати до уваги) | червоне                | 8   |
| 70 | Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)                  | світле                 | 3   |
| 71 | Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69)   | ознака не визначалась  | 0   |
| 72 | Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)   | ознака не визначається | 0   |
| 73 | Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)  | ознака не визначається | 0   |
| 74 | Стиглий плід: забарвлення м'якоті  | жовте                  | 2   |
| 75 | Стиглий плід: здерев'яніння шкірки   | відсутнє               | 1   |
| 76 | Стиглий плід: структура м'якоті  | не волокниста          | 1   |
| 77 | Насініна: за розміром  | велика                 | 7   |
| 78 | Насініна: форма  | еліптична              | 5   |
| 79 | Насініна: лушпиння   | наявне                 | 9   |
| 80 | Насініна: наявне лушпиння  | повністю розвинене     | 2   |
| 81 | Насініня: за кольором  | білувате               | 1   |

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Вміст сухої речовини – 6,5 %, тривалість періоду до досягнення – 95 діб.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп, Полісся.