

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 12024004 Назва сорту: Бартеса

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160296

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1
3	Стебло: фасціяція	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	середнє	5
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня кількість	5
6	Листя: забарвлення	зелене	2
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листя: (ozn. б, стан 2): Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
8	Листок: вторинні листочки	наявні	9
9	Листок: кількість вторинних листочків	середня кількість	5
10	Вторинний листочок: за розміром	малий	3
11	Вторинний листочок: за довжиною	короткий	3
12	Вторинний листочок: за шириною	вузький	3
13	Вторинний листочок: положення найширшої частини	ближче до основи	2
14	Вторинний листочок: зубчастість	слабка	3
15	Прилисток: за довжиною	короткий	3
16	Прилисток: за шириною	вузький	3
17	Прилисток: за розміром	малий	3
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5
19	Прилисток: частина під пазухою за довжиною	коротка	3
20	Прилисток: плямистість	наявна	9
21	Прилисток: щільність плямистості	дуже не щільна	1
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листка чи вусика	короткий	3
23	Лише сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначалась	0
24	Час цвітіння	ранній	3
25	Лише нефасційовані сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3
26	Лише сорти з антоціаном. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначалась	0
27	Лише сорти без антоціану. Квітка: колір паруса	білий	1
28	Квітка: ширина паруса	середня	5
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3
31	Квітка: ширина чашолистка	середня	5
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	загострена	2
33	Квітконіжка: за довжиною	коротка	3
34	Квітконіжка: відстань від стебла до першого бобу	середня	5
35	Квітконіжка: відстань між першим і другим бобом	коротка	3
36	Квітконіжка: кількість приквітків	середня кількість	2
37	Біб: за довжиною	короткий	3
38	Біб: за шириною	дуже вузький	1
39	Біб: пергаментність	відсутня або часткова	1
40	За винятком пергаментних сортів. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	загострена	1
42	Біб: ступінь вигину	сильний	7
43	Біб: колір	зелений	2
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (Ozn. 43; стан 2): інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
45	За винятком пергаментних сортів. Біб: волокна шва	відсутні	1
46	Біб: кількість насінних зачатків	середня кількість	5
47	Не стигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
48	Насінина: загальна форма	циліндрична	2
49	Насінина: тип крохмальних зерен	складний	2
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначалась	0
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: ступінь зморшкуватості	сильна	7
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	зелене	1
53	Лише сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної шкірки	ознака не визначалась	0
54	Лише сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці	ознака не визначалась	0
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінної шкірки	1
56	Лише сорти з антоціаном: Насінина: забарвлення насінної шкірки	ознака не визначалась	0
57	Насіння: маса 1000 шт.	мала	3
58,1	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i> Pasa 1	ознака не визначалась	0
58,2	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i> Pasa 5	ознака не визначалась	0
58,3	Стойкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i> Pasa 6	ознака не визначалась	0
59	Стойкість до <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	ознака не визначалась	0
60	Стойкість до <i>Ascochyta pisi</i> , Race C	ознака не визначалась	0
61	Стойкість до <i>Erysiphe communis</i> Syd.	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 5 т/га. Період від повної схожості до початку технічної (споживчої) стиглості – 60 діб. Вміст білка – 23 %. Стойкість проти ураження хворобами: аскохітоз – 8 балів, кореневі гнилі – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.