

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 13096009 Назва сорту: Воитель

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.03.2016 Патент № 160069

Дата пріоритету: 05.12.2013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160301

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|------|---|--------------------------|-----|
| 1,1 | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою | низька | 3 |
| 1,2 | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою | ознака не визначається | 0 |
| 1,3 | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою | ознака не визначається | 0 |
| 2,1 | Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками) | малий | 3 |
| 2,2 | Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) | ознака не визначається | 0 |
| 2,3 | Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1) | ознака не визначається | 0 |
| 3 | Рослина: довжина зовнішнього качана | короткий | 3 |
| 4 | Рослина: положення зовнішніх листків | напівпрямостоячі | 3 |
| 5,1 | Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром | малий | 3 |
| 5,2 | Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром | ознака не визначається | 0 |
| 5,3 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром | ознака не визначається | 0 |
| 6 | Зовнішній листок: форма пластинки | поперечноширокоеліптична | 4 |
| 7 | Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки | плаский | 2 |
| 8,1 | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості | помірна | 2 |
| 8,2 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості | ознака не визначається | 0 |
| 9,1 | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів | середні | 5 |
| 9,2 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів | ознака не визначається | 0 |
| 10 | Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість | ознака не визначається | 0 |
| 11 | Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом) | сіро-зелений | 3 |
| 12 | Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення | світле | 3 |
| 13 | Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість | ознака не визначається | 0 |
| 14 | Зовнішній листок: восковий наліт | слабкий | 3 |
| 15 | Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю | помірна | 5 |
| 16 | Зовнішній листок: вигин краю | відсутній | 1 |
| 17 | Головка: форма поздовжнього розтину | широкоеліптична | 4 |
| 18 | Головка: форма основи поздовжнього розтину | ознака не визначалась | 0 |
| 19 | Головка: за довжиною | коротка | 3 |
| 20 | Головка: за діаметром | маленька | 3 |
| 21 | Головка: розміщення найбільшого діаметра | посередині | 2 |
| 22 | Головка: ступінь покриття | покрита | 3 |
| 23 | Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка | ознака не визначається | 0 |
| 24 | Головка: вигин краю покривного листка | наявний | 9 |
| 25 | Головка: забарвлення покривного листка | сіро-зелене | 3 |
| 26 | Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка | ознака не визначалась | 0 |
| 27 | Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 28 | Головка: внутрішнє забарвлення | білувате | 1 |
| 29 | Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 30 | Головка: за щільністю | нещільна | 3 |
| 31 | Головка: внутрішня структура | тонка | 3 |
| 32 | Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки | коротка | 3 |
| 33,1 | Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості | ранній | 3 |
| 33,2 | Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості | ознака не визначається | 0 |
| 33,3 | Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості | ознака не визначається | 0 |
| 34 | Час розтріскування головки після досягання | пізній | 7 |
| 35 | Чоловіча стерильність | ознака не визначалась | 0 |
| 36 | Стойкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f sp. <i>Conglutinans</i> | ознака не визначалась | 0 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 60 т/га; період від сівби до початку досягання – 65 діб; вміст загального цукру – 2,0 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.