

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 13096003 Назва сорту: Лагріма

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160051

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	довгий	7
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірна	2
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	світле	3
13	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	широкоеліптична	4
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	ознака не визначалась	0
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	частково покрита	2
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	ознака не визначалась	0
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f sp. <i>Conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 117 т/га; період від сівби до початку досягання – 141 доба; вміст вітаміну С – 46 мг%; вміст сухої речовини – 7,0 %; вміст загального цукру – 5,0 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.