

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 11028023 Назва сорту: СВ3388ЖЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету: 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160300

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	довгий	7
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірна	2
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	середні	5
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	світле	3
13	Лише для сортів капусти білоголової і савойської. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабка	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	округла	3
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	ознака не визначалась	0
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	ознака не визначалась	0
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	щільна	7
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	довга	7
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	дуже пізній	9
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стойкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Загальна урожайність – 74 т/га; період від сівби до початку досягання – 120 діб; вміст вітаміну С – 56 мг%; вміст сухої речовини – 8,7 %; вміст загального цукру – 4,4 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.